



ที่ พร ๐๐๓๓.๓ / ว ๔๖๗๙)

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้น เป็นพิเศษ

เรียน นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๙๓.๔/ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค เมือ เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ โดยได้จัดส่งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา และแนวทางตาม - ตอบ โรคเมือ เท้า ปาก ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวตามแนวทางการเฝ้าระวังฯ ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค <http://beid.ddc.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอําเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภารัตน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ก. ๒๖๗๙



ที่ มหาดไทย ๔๗๐๐

สำเนาทางสื่อสารและการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ริม
เลขที่ 4682
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๓๔
เวลา ๑๖.๗๔
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗๓ ตุลาคม ๒๕๓๔

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก
ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก จำนวน ๑ ชุด
สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา
๒. คำตาน - คำตอบ โรคเมือ เห้า ปาก
ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดำเนินมาตรการป้องกัน
ควบคุมการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ สรุปความเป็นมาและสาระ
ของการขอความร่วมมือ ดังนี้

๑. จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักงาน疾控 กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ จาก ๗๗ จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) พบรู้ป่วยโรคเมือ เห้า ปาก
จำนวน ๕,๘๔๒ ราย โดยมีผู้ป่วยที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว จำนวน ๕ ราย เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิมในช่วงปี ๒๕๓๐ - ๒๕๓๓ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตเที่ยง ๖ ราย โดยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยประมาณ ๒ ปี ลดลงจาก
เดิมซึ่งอยู่ที่ประมาณ ๓ ปี ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเริ่มขยายวงกว้างในหลายจังหวัดภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากไม่มีการป้องกันควบคุมที่ดีแล้วอาจมีการระบาดทั่วประเทศได้

๒. โรคเมือ เห้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อเอ็นเตอร์ไวรัส (Enterovirus) พบรู้ป่วยในกลุ่ม
เด็กแรกและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี การระบาดมักเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยทั่วไป
มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยมีไข้ต่ำๆ เกิดตุ่มพองและแผลเล็กๆ ในปาก คอ มีตุ่มที่มือ เห้า และบริเวณก้น
แท๊งเชื้อไวรัสบางส่วนพันธุ์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคนี้ติดต่อได้จากการสัมผัส
โดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือตุ่มพอง และแผลของผู้ป่วย รวมทั้งการติดต่อทางน้ำหรืออาหาร

๓. เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิด
การเสียชีวิตและการระบาดของโรคนี้ในวงกว้าง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ในระดับ
จังหวัด ร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว ในศูนย์เด็กเล็ก สถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานศึกษา และในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
ควรดำเนินมาตรการที่จำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ ดังนี้

๓.๑ กำหนดขั้นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก สำหรับศูนย์เด็ก
เล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา โดยดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังที่ส่งมาพร้อมนี้

๓.๒ เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคทางด้านสาธารณสุขและด้านการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ทั้งภาครัฐและเอกชน

๓.๓ เร่งรัดและขยายช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันความคุมครอง การแยกเด็กป่วยให้หยุดเรียนอยู่บ้าน
การทำความสะอาดพื้นผิวที่เด็กสัมผัสด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำยาฟอกผ้าขาวอย่างถูกวิธี โดยประชาสัมพันธ์
ตามแนวทาง คำถาด – คำตอบที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ^{แก้ไข}
เท้า ปาก ที่มีความจำเพาะและเข้มข้นเป็นพิเศษ ของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
จึงขอให้จังหวัดกำชับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค
ดังกล่าว โดยสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุม
โรค <http://beid.ddc.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพronay สุวรรณรัฐ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการศึกษาอกรอบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
โทร ๐-๒๒๔๑-๘๐๒๑-๓ ต่อ ๑๒๕
โทรสาร ต่อ ๑๑๒-๑๑๓

แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันความคุยการะบาดของโรคเมือ เห้า ปาก สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเรียนเด็ก และสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค
ปรับปุ่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

การเฝ้าระวังโรค

๑. ในจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาด

ให้ครุภำการศักดิ์รองเด็กทุกเชื้า โดยถูแผ่นในปากและมีน้ำร้อนต้มน้ำที่ใส่มือ เมื่อพบความผิดปกติให้พนแพทย์เพื่อการวินิจฉัย หากพบว่าเป็นโรคเมือ เห้า ปาก ให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ร่วมกับดำเนินมาตรการอื่นๆ ตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เห้า ปาก ในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก

๒. ในจังหวัดที่มีการระบาด หรือโดยเดpathาอ้างอิงที่รับผิดชอบ

ให้ครุภำการศักดิ์รองเด็กทุกเชื้า

- หากพบแผ่นในปาก (เด็กมักจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วงเมื่อจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแพ้ในปากเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผื่นแดงมีดี หรือเห้ากิ้ด และสามารถแพ้หรือเสื่อมไปสู่เด็กคนอื่นๆ และในสิ่งแวดล้อมได้
- ควรประสานกับผู้ปกครองทั้งหมดที่ร่วมทราบข่าวว่ามีการระบาดในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้ปกครองช่วยทำการเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก และแจ้งโรงเรียนเมื่อเด็กมีอาการแพ้ในปาก โดยเฉพาะในรายที่มีไข้สูงต้องรับน้ำไปพับแพท์ (โดยอาจจะยังไม่มีแพ้ในปาก) เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีอาการรุนแรงมากเมื่ออาการไข้สูงรุนแรงด้วย โดยที่เด็กอาจจะมีหรือไม่มีแพ้ในปากก็ได้

การดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เห้า ปากในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก

๓. ก่อนเปิดภาคเรียน

๑. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องล้วน อาคารสถานที่ต่างๆ
๒. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ส้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องล้วน
๓. แนะนำครู เรืองโรคเมือ เห้า ปาก และอนามัยส่วนบุคคล และเตรียมการกรณีเกิดการระบาดในโรงเรียน

๔. ช่วงเปิดภาคเรียน

๑. เผยแพร่ ให้คำแนะนำ ความรู้เรื่องโรคเมือ เห้า ปาก แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองช่วยส่งเด็กของการเด็กตั้งแต่เนินๆ
๒. สำรวจและรักษาสุขสัจจnost ของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการทำลายเชื้อในอุจจาระ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง

๒.๓.ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดี หมั่นล้างมือบ่อยๆ และตัดเล็บให้เรียบ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนการปฐมภาระ ภายหลังการขับถ่าย หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก

๒.๕ เมืองรักษากฎหมายเด็กก่อนเข้าห้องเรียน ถ้ามีอาการป่วย มีไข้ หรือมีดิน痰ในฟันฝ่ามือ ผู้เด็กให้แยกตึกป่วยอยู่ห้องพยาบาล ติดต่อให้ผู้ปกครองพากลับบ้านและไปพบแพทย์ โดยที่ว่าไปอาการโรคเมื่อ เด็ก ป่วยจะไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติสักภายใน ๗ - ๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการแพ้รักษาซึ่ง เช่น ไข้สูง ขึ้น อาเจียน หอบ ต้องรับน้ำเด็กกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสักทันที ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีภัยระบาด หากพบคุณในป่าโดยยังไม่มีอาการอื่น ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้านได้เลย

๒. การนิมิตึกป่วย

- ให้แจ้งรายงานโรคเป็นน้ำที่สาธารณะสุข และขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค เพิ่มความต่อการท้าความสะอาดของที่เต็กรืบด้วยเป็นประจำ เช่น ของเส่น พื้นห้อง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละครั้ง (ไม่ใช่แค่การถูด้วยไม้มีกาว หรือใช้ผ้าเช็ด) สำหรับโรงเรียนที่มีของเส่นจำนวนมากไม่สามารถทำความสะอาดของเส่นอปางทั่วถึงได้ทุกวัน ขอให้ล้างจานของเส่นสำหรับเด็กในแต่ละห้องให้เหลือเฉพาะชิ้นที่ใช้ปอยๆ และถ้าเป็นศูภษาส์ (ซึ่งไม่สามารถถังได้โดยง่าย) อาจงดไม่ให้เด็กเล่นในช่วงที่มีการรับประทาน รวมทั้งเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง และดูแลให้กระวายน้ำมีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน คือ ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ๑ ppm (part per million)
 - ให้เด็กและครูที่ถูกแพร่การล้างมือมากขึ้น โดยเฉพาะการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร ควรล้างมือด้วยสบู่ยูกครั้ง และไม่ควรให้สบู่อยู่ในสภาพดูดี้ เนื่องจากการทำให้เกิดติดเชื้อในก้อนสบู่ และแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆ ได้มากขึ้น
 - ลดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละห้อง เนื่องจากจะเป็นไปได้
 - แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ช้อน และผ้าเช็ดมือ
 - แจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้ามาป่วยເฝົ້າຮ່ວມໄຕມືອ ເທົ່າ ປັກ ໃຫ້ແກ່ສູບຮ່າຍຂອງໂຮງເຮັດ ແລະ ໜ້າຍງານສາຫະລຸນສຸຂຖາວນທີ່ພັບຜູ້ປ່າຍຮ່າຍໃໝ່ທີ່ເົ້າປ່າຍການເຳເກົ່າຮ່ວມໄຕ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້ານ້າທີ່ສາຫະລຸນໄດ້ ຄໍາເນີນການປະສານງານເພື່ອໃຫ້ຊຸກສຶກພາກແກ່ໜຸ່ມນຸ່ນ ໃນການສັດກາເລັ່ນຄຸກຄົກໃນເຕັກ (ເນັ້ນເນື້ອຫາໄທທີ່ໄມ່ປ່າຍໄມ່ໄປເລັ່ນຄຸກຄົກໃກ້ບັນຍືນື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ງວ່າໄຕບັນຍືນື່ນໆ) ຈົນກວ່າພັນຍະກາຮະບາດໃນໜຸ່ມນຸ່ນໆ

ผู้ดูแลระบบอนามัยที่ดี ช่วยในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงโภคภัย เห้า ปาก ได้แก่

๓.๔ ไม่ควรนำเต็กเก้าไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น สนามศักดิ์สิทธิ์ ห้างสรรพสินค้า ตลาดน้ำ และสระว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี

๓.๒ ถ้ามีให้สามารถด้วยน้ำและสปุ๊ก ก่อนแต่หนังหินจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

๓.๓ ไม่ใช้ภาษาแนะนำหรือสิ่งของร่วมกัน เช่น งาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หรือผลอุดมร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร

๓.๔ ใช้ผ้าเช็ดหน้าปีตปากและจมูก เมื่อไอหรือยาม และถ่างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และงดยืนตัวต่อตัวระหว่างการใช้ยาและรดน้ำ

๒. การแจ้งการระบาด ของเชื้อสาร และคำแนะนำให้ที่

๔.๑ ก足以กษาพหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๖๐๕-๘๗๐๖ และ ๐-๒๓๕๕-๑๙๗๖
- สำนักงานคุณภาพฯ โทร. ๐-๒๕๕๖-๑๔๔๖ และ ๐-๒๕๕๖-๑๔๔๖
- สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐-๒๕๕๖-๑๑๔๘

๔.๒ ทางสังฆาราม ติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักงำนาดวิทยา กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยการแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>

คำถ้าม - คำตอบ โรคเมือ เห้า ปาก

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘

๑. โรคเมือ เห้า ปาก เกิดจากเชื้ออะไร?

ตอบ เกิดจากเชื้อไวรัสในสำนักน้ำลาย สายพันธุ์ที่ก่อโรคเมือ เห้า ปาก ได้แก่ เชื้อไวรัสโคกแซกเก้อ ปี (Coxsackie virus gr. A, B) และเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus ๖๙-๗๐) โดยสายพันธุ์ที่มักทำให้เกิดอาการรุนแรงได้แก่ เชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) หรือ EV๗๐ ซึ่งพบเป็นต่างประเทศหลายล้านปี แล้ว ส่วนในประเทศไทยพบเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) หรือ EV๗๐ ครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนั้นมีผู้ป่วยประปราย พบริการระบบเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. โรคนี้พบที่ใดบ้าง?

ตอบ โรคนี้พบผู้ป่วยได้ทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงที่มีสาเหตุจากเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) หรือ EV๗๐ ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซีย ไต้หวัน เวียดนาม จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ในช่วงร้อนชื้น โรคเกิดแบบประปรายตลอดปี พบรากในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาการเย็นและชื้น การระบบมักเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พบรู้ป่วย ๕,๕๐๔ ราย จาก ๓๗ จังหวัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็ก หรือเยาวชน เด็ก ๕-๑๔ ปี ซึ่งพบมากที่สุด จำนวน ๔,๕๐๔ ราย (มีผลบันยันเชื้อ EV๗๐ เพียง ๑ ราย ที่จังหวัดพะบุรี อีก ๑ ราย อาการเข้าได้กับโรคนี้ แต่ยังไม่มีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ หรืออยู่ระหว่างรอผล ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา หนองบัวลำภู ชัยภูมิ) และกำลังรักษาตัวอยู่ในแผนกผู้ป่วย ฉุกเฉิน (ICU) ๑ ราย (นครราชสีมา)

๓. โรคเมือ เห้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) กับ โรคปากเห้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) แตกต่างกันอย่างไร?

ตอบ โรคเมือ เห้า ปาก นั้นเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน ส่วนโรคปากเห้าเปื่อย เกิดจากเชื้อไวรัสคนละสัตว์กัน อยู่ในครอบครัวเดียวกัน (Family) แต่คนและสัตว์ (Genus) และเป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กับ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น ทำให้สัตว์ที่ป่วยมีอาการเป็นแผลที่ปากและก้นเห้า สัตว์ที่ป่วยมักไม่ตาย หรือมีอัตราป่วยตายต่ำ ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อถึงคน แม้ว่าโรคทั้ง ๒ โรคจะแสดงอาการทั้งในคนและสัตว์คล้ายคลึงกันก็ตาม แต่เป็นคนละโรค และไม่สามารถติดต่อกันระหว่างคนและสัตว์ได้

๔. ใครบ้างเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเมือ เห้า ปาก ที่มีอาการรุนแรง?

ตอบ ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วหายได้เอง แต่เด็กอ่อนและเด็กมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากกว่าเด็ก ในรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจเสียชีวิตจากสมองข้อเสบ หัวใจวาย 昏迷/หลับกันไม่ตื่น ปอด

๔. จะรู้ได้อย่างไรว่าบุตรหลานป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก?

ตอบ ส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยภายใน ๓ - ๕ วัน หลังได้รับเชื้อ จะมีไข้เป็นอาการเริ่มแรก มีตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นในปากมักพบที่ลิ้น เพศานอ่อน และกระเพุงแก้ม ทำให้หื้งปาก ไม่ดูคนมี หรือไม่รับประทานอาหาร และพบตุ่มพองที่บริเวณ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อาจพบที่ก้น ต่อมอาจจะหากอกเป็นหุ่มศีนๆ อาการจะดีขึ้น แล้วแผลจะหายไปใน ๗ - ๑๐ วัน ในบางรายอาจไม่พบตุ่มพองแต่อย่างใด แต่อายุมีอาการรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก้านสมองอักเสบ ตามมาด้วยปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตสัม伍คลวท่าให้เสียชีวิตได้ มีสัญญาณอันตรายได้แก่ ไข้สูงไม่คล่อง อาเจียนบ่อย หอบ และแขนขาอ่อนแรง

๕. การวินิจฉัยโรคเมือ เท้า ปาก ทำได้อย่างไร?

ตอบ โดยทั่วไป แพทย์จะวินิจฉัยจากอายุ ประวัติ และอาการ โดยสังเกตถุงลมผิวนหรือตุ่มแพลงค์ต่างๆ ที่ปรากฏ รวมถึงวินิจฉัยแยกจากโรคที่มีอาการแผลในปากอื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อริโนในช่องปาก ฯลฯ สำหรับการสังเคราะห์วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมักไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพราะต้องใช้ เวลานาน ๒ - ๕ สัปดาห์ เพื่อแยกแยะยืนยันเชื้อสาเหตุ ซึ่งทำในเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง หรือ เพื่อยืนยันการระบาดเท่านั้น

๖. โรคนี้รักษาได้หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ รักษาได้ โดยใช้การรักษาตามอาการ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยานักป่วย ฯลฯ แต่ไม่มียาท้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ โรคนี้หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และพักผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่ผู้ติดแล้วยังคงมีไข้ต่อไปได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กดูมเด็กหารอก เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อสังเกตอาการแพร่กระจายที่อาจรุนแรง ลึกลึกลับ และสูญเสียรับการรักษาได้ทันท่วงที

๗. หากบุตรหลานมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร?

ตอบ ให้แยกตัวป่วยออกจากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบแพทย์ และพักรักษาตัวที่บ้านเป็นเวลาประมาณ ๕ - ๗ วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างวันนี้ควรสังเกต อาการติดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไข้สูง ชื้น อาเจียน หอบ เป็นต้น ซึ่งควรรีบพาไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลทันที ไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สารวิทย์น้ำ ห้างสรรพสินค้า หรือ ตลาด ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ใช้ผ้าปิดปากจมูกเวลาไปจาม และระมัดระวังการอ่อนแรงที่กัน นกจากน้ำ ผู้เสียชีวิตต้องสังมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือ ถุงน้ำเหลืองป่วย

๘. ผู้ใหญ่สามารถติดต่อโรคเมือ เท้า ปาก จากเด็กได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ใหญ่มักมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคนี้ เมื่อจากได้รับเชื้อจะเป็นเต็ก ซึ่งภูมิคุ้มกันทันทันนี้จำเป็น กันชนิดของไวรัสที่เคยได้รับเชื้อ หากได้รับเชื้อชนิดใหม่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ศักสามารถเป็นโรคได้อีก ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อื่นได้

๑๐. หญิงมีครรภ์ที่ได้รับเชื้อโรคเมือ เท้า ปาก จะติดต่อไปสู่เด็กในครรภ์ได้หรือไม่?

ตอบ ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีอาการป่วย ควรรับประทานแพทเทอร์ และในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแสดงว่าการติดเชื้อมีผลต่อการแท้งบุตร ความพิการ ของเด็ก หรือจะทำให้เด็กเสียชีวิตในครรภ์ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เด็กอาจได้รับเชื้อขณะคลอดหาก มาตรดำเนินไปในช่วงใกล้คลอด เด็กแรกเกิดที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงเล็กน้อยไม่รุนแรง

๑๑. จะป้องกันโรคเมือ เท้า ปาก ได้อย่างไร?

ตอบ ให้ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส (อุปกรณ์เครื่องเรือน เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ) ทึ้งในบ้าน สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า แนะนำให้ทำ ความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก ปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาว เช่น ไอลเตอร์ คลอรอลอร์ ทึ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้าง/เช็ด/แขวน ด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีที่ก้าง ถ้วนของเล่นที่เด็กอาจ เอาเข้าปากได้ ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ และนำไปผสานแคด

๑๒. หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร?

ตอบ มาตรการชั่วที่เกิดโรคระบาด ต้องเน้นการสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งอาจมีความจำเป็น ต้องประกาศฉตดโรค และปิดสถานที่ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนเด็กเล็ก (อาจรวมถึง สรรวายน้ำ และสถานที่แอดอัป) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กป่วย และเน้นการส้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ รวมทั้งการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลและบ้านเรือนที่มีผู้ป่วย โดยผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยง ควรดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งการระบาดไปที่หน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวน การระบาด ให้ความรู้ และคำแนะนำ
- เผยแพร่คำแนะนำ เรื่องโรคเมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือ และการรักษาสุขศักดิ์สิทธิ์ที่ดี ใน การป้องกันโรค ได้แก่ การแยกของใช้ไม่ใช้ปะปนกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร
- เฝ้าระวังโดยตรวจเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มีอาการโรคเมือ เท้า ปาก ต้องรับแยกกักและ ให้หยุดเรียน ๗ - ๑๐ วัน หรือจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่นๆ
- ควรรับພาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดห้องโรงเรียนชั่วคราว (กรณีมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือ หลักขั้นเรียน) ประมาณ ๕ - ๗ วัน
- หากพบว่ามีการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก หรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส (Enterovirus) หรือ EV-๗๙ ในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาให้ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระชาญในหลักขั้นเรียน แนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทា ความสะอาด ดูปกรณ์รับประทานอาหาร ของเด่นเด็ก ห้องน้ำ สรรวายน้ำ ถุงแล้วให้สรรวายน้ำ มีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ๑ ppm (part per million)

- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อย่างเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สร้างวัยน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เส่นของเด็ก สมามเด็กเล่น โดยใช้สารคลอรายเจียจากของน้ำยาฟอกผ้าขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑ ลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด
- ทำความสะอาดของเส้นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
- หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่าง ผ้าม่าน ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

๑๓. คลอรินในสรรว่ายน้ำย่างเชื้อโรคมี เท่า มาก ได้หรือไม่?

ตอบ ความเข้มข้นของคลอรินในสรรว่ายน้ำตามมาตรฐานต้องมีอย่างน้อย ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร [๑ ppm (part per million)] ซึ่งมีปริมาณคลอรินเพียงพอที่จะกำจัดเชื้อไวรัสอย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำเด็กป่วยไปสรรว่ายน้ำ และควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสรรว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด

๑๔. ความเสี่ยงต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่เกิดโรคนี้ระบาด มีมากน้อยเท่าใด?

ตอบ ไม่มีข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่กำลังเกิดโรคนี้ระบาดอยู่ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด รักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ในสถานที่远离人群 เท่านั้น

๑๕. แจ้งการระบาด ได้ที่ใดบ้าง?

ตอบ - สำนักงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรค โทร. ๐-๒๔๓๘๐-๑๙๙๙๖ และ ๐-๒๔๓๘๐-๑๙๙๙๗
- สำนักงานสาธารณสุขแขวงหัวหมากแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๒๕๕-๘๑๐๖

๑๖. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ของเอกสารและคำแนะนำได้ที่ใดบ้าง?

ตอบ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตโนนทันที
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๒๕๕-๘๑๐๖ และ ๐-๒๒๒๕๕-๘๑๐๒
- สำนักงานควบคุมโรค โทร. ๐-๒๔๓๘๐-๑๙๙๙๖ และ ๐-๒๔๓๘๐-๑๙๙๙๗
- สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐-๒๔๓๘๐-๑๙๙๙๘

ทางสังฆาราม ติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขแขวงหัวหมากแห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๙๙๙๖
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักงานควบคุมโรค กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>