



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ ก ๙๗๔

๙๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการผู้ราชวังป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบบ
เรียน นายอ่ำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/๑ ๑๗๗
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือกำชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมือ
เท้า ปาก ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาและชุมชน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

กู้เร็ว
รบ!

๖๗๒/

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/๙๙๗๙/ล



หนังสือร่างประกาศของห้องถินพัฒนาชีวภาพ
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
รับที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ถนนคราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๙ / มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังบ้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบบ
เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

ส่วนที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๙๗๗/๐๙๕๐๖

ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

จำนวน ๑ ชุด

๒. องค์ความรู้โรคเมือ เท้า ปาก

จำนวน ๑ ชุด

๓. คำถาม - คำตอบ โรคเมือ เท้า ปาก

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ให้แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถินดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา
และชุมชน ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก ปี ๒๕๕๙
ของกระทรวงสาธารณสุข พบรู้ป้ายห้องสิ่น ๔๐,๕๗๗ ราย มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๖๒.๒๑
ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยลดลง จำนวน ๒๔,๗๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘ โดยส่วนใหญ่
พบทั้งวัยเด็กเล็กและเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรงแต่บางราย
อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบบ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินในพื้นที่ทุกแห่งให้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา
และชุมชน ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้พบรับทราบ
หรือมีเหตุสังสัยว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินแจ้งให้
สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยด่วน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สามารถศึกษาแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานโรคติดต่อที่นำไป กรมควบคุมโรค <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บูรพา

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโภสุ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน

ส่วนส่งเสริมการศึกษาระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน

โทร. ๐ - ๒๑๔๑ - ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๗๒ โทรสาร ต่อ ๔๗๙



บันทึกข้อความ

31088
จ.ส.ก.ว. ๒๕๕๙

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐-๒๖๓๗-๓๕๕๐

ที่ มา ๐๖๒๗/๑๗๔๐๖

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเมือง เท้า ปาก ปี ๒๕๕๙ ของกระทรวงสาธารณสุข พบรู้ป่วยทั้งสิ้น ๔๐,๔๗๗ ราย มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๖๗.๗๑ ต่อแสนประชากร เมื่อเทียบกับ ปี ๒๕๕๘ มีผู้ป่วยลดลงจำนวน ๒๔,๗๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๘ โดยส่วนใหญ่ พบรู้ป่วยเด็กและเด็กโต โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรงแต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตและการระบาดอย่างเป็น วงกว้างของโรคดังกล่าว จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามแนวทางการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมือง เท้า ปาก ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายชัยพล ศรีตังคติ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น	เลขรับ..... 5454
วันที่ - ๖ ส.ค. ๒๕๕๙	เวลา.....

งานส่งเสริมการศึกษาก่อนระบบและพัฒนาศักยภาพเยาวชน	เลขรับ..... 3214
วันที่ ๐๖ ส.ค. ๒๕๕๙	เวลา..... ๑๖.๐๑

องค์ความรู้โรคเมือ เท้า ปาก

โรคเมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน สาเหตุเดิมจากการติดเชื้อไวรัส เอโนเทโร (Enterovirus) หลายชนิด อาจมีอาการรุนแรงถึง死ีชีวิตได้ โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนการรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็ก รวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิดใช้ภาชนะอาหาร หรือของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ร่วมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไป การจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ

การป้องกันโรค

๑. ก่อนเปิดภาคเรียน

๑.๑. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ

๑.๒. จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วม

๑.๓. แนะนำครูในโรงเรียน เรื่องโรคเมือ เท้า ปาก และอนามัยส่วนบุคคล และเตรียมการกรณีเกิดภัยระบาดในโรงเรียน

๒. ช่วงเปิดภาคเรียน

๒.๑. เมยแพร์ ให้คำแนะนำ ความรู้เรื่องโรคเมือ เท้า ปากแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งให้ผู้ปกครองช่วยสังเกตอาการเด็กตั้งแต่เนิ่นๆ

๒.๒. ควรดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด ถูและสูขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการทำลายเชื้อในอุจจาระ และการทำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง

๒.๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนการปฐมอาหาร ภายหลังการขับถ่าย หรือลั่นผ้าสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก

๒.๔. ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หมั่นล้างมือบ่อยๆ และตัดเล็บให้สั้น ให้แยกเด็กป่วยอยู่ห้องพยาบาล ติดต่อให้ผู้ปกครองพากลับบ้านและไปพบแพทย์ โดยทั่วไปอาการโรคเมือ เท้า ปาก จะไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติได้ภายใน ๗-๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ชีม อาเจียน หอบ ต้องรับน้ำเด็กกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีภัยระบาด หากพบตุ่มในปาก โดยยังไม่มีอาการอื่น ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้านได้เลย

๒.๕. กรณีมีเด็กป่วย

- ให้แจ้งรายงานโรคแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค เพิ่มความตื่นตัว การทำความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับต้องเป็นประจำ เช่น ของเล่น ของใช้ โต๊ะ เก้าอี้ พื้นห้อง ต้องทำความสะอาดอย่างน้ำยาฆ่าเชื้อย่างน้อยวันละครั้ง (ไม่ใช่แค่การด้วยไม้กวาดหรือใช้ผ้าเช็ด) ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อย่างน้อยวันละครั้ง (ไม่ใช่แค่การด้วยไม้กวาดหรือใช้ผ้าเช็ด) สำหรับโรงเรียนที่มีของเล่นจำนวนมาก ไม่สามารถทำความสะอาดของเล่นอย่างทั่วถึงได้ทุกวัน ขอให้ลดจำนวนของเล่นสำหรับเด็กในแต่ละห้องให้เหลือเฉพาะขั้นที่ใช้ปอยๆ และถ้าเป็นตู้ตาข่าย (ซึ่งไม่สามารถล้างได้โดยง่าย) อาจงดไม่ให้เด็กเล่นในช่วงที่มีภัยระบาด รวมทั้งเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง และดูแลให้สรรว่ายน้ำมีระดับคลอรินที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ๑ ppm (part per million)

- ให้เด็กและครูที่ดูแลมีการล้างมือบ่อยขึ้น โดยเฉพาะการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง และไม่ควรให้สบู่อยู่ในสภาพแพร่กระจายเป็นการทำให้เชื้อติดอยู่ในก้อนสบู่และแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆได้มากขึ้น
- ลดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละห้อง เท่าที่จะเป็นไปได้
- แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น แก้วน้ำ 並將สีพื้น ช้อน และผ้าเช็ดมือ
- แจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้าป้ายเฝ้าระวังโควิด เท้า ปาก ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณสุขทุกวันที่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าข่ายการเฝ้าระวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ดำเนินการประสานงานเพื่อให้สุขศึกษาแก่ชุมชน ในการลดการเล่นคลุกคลีกันเด็ก (เน้นเนื้อหาให้เด็กที่ไม่ป่วยไม่ไปเล่นคลุกคลีกับเด็กบ้านอื่นๆ เพราะเมื่อรู้ว่าใครบ้างที่ป่วย) จนกว่าพัฒนาระบบที่ชุมชนนั้นๆ
- หากมีเด็กป่วยจำนานมากควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หรือปิดโรงเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ๓. ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดี ช่วยในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงโควิด เท้า ปาก ได้แก่
 - ๓.๑. ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณสุขที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ๆ เช่น สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสะพายน้ำ ควรอยู่ในที่มีการระยะทางถ่ายเทอกาศได้ดี
 - ๓.๒. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังหยอดจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย ห้ามไม่เด็กและผู้ใหญ่
 - ๓.๓. ไม่ใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หรือหยอดดูดร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
 - ๓.๔. ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก เมื่อไอหรือจาม และล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระมัดระวังการไอจามรดกัน
- ๔. การแจ้งการระบาด ขอเอกสาร และคำแนะนำได้ที่หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล โรงพยาบาลอำเภอและศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ หั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ยินดีให้ความสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการในการป้องกันโรคได้อย่างเต็มที่

คำถ้าม - คำตอบ โรคเมือ เท้า ปาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑. โรคเมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) คือโรคอะไร

โรคเมือ เท้า และปาก เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส อาการป่วย ได้แก่ มีไข้ มีจุดหรือสิ่นแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระเพุ่งแก้ม และเกิดผื่นแดง ซึ่งจะกลایเป็น คุ่มพองใส่รอบๆ แดง (มักไม่คัน เวลากดจะเจ็บ) ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า อย่างไรก็ตาม บางราย อาจไม่พบอาการคุ่มพองในปาก ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า แต่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมน้ำ และ เสียชีวิตได้ โรคนี้พบบ่อยในเด็กหากแพร่เด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี พบร้อยละในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี และ น้อยมากในเด็กวัยรุ่น

๒. โรคนี้พบที่ใดบ้าง

โรคนี้พบปูริษัยและการระบาดได้ทั่วโลก มีรายงานการระบาดครุณแรงที่มีสาเหตุจากเอนเทอโรไวรัส ๗๑ ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซียและบูรีน (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไต้หวัน (พ.ศ. ๒๕๔๑) สิงคโปร์ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้น

ในเขตตอนบน โรคเกิดแบบประปรายตลอดปี พบรากชื้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศเย็นและชื้น การระบาดมักเกิดชื้นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

๓. โรคเมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) กับ โรคปากเท้าเปื้อย (Foot and Mouth Disease) แตกต่างกันอย่างไร

โรคเมือ เท้า ปาก นั้นเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน ส่วนโรคปากเท้าเปื้อย เกิด จากไวรัสตัวอื่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กีบ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น ทำให้สัตว์ป่วยมี อาการเป็นแผลที่ปากและก้นเท้า สัตว์ที่ป่วยมักไม่ตายหรือมีอัตราป่วยตายต่ำ ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อถึงคน โดยในอดีตเคยพบผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย มีอาการเล็กน้อยและหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษา

๔. สาเหตุของโรคเมือ เท้า ปากเกิดจากอะไร

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโรหลาຍชนิด ที่พบบ่อย คือ เชื้อโคxsackie B โฉ ๑๖ (coxsackie A๑๖) และไวรัสอีน่า ที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ โคxsackie B type อีน่า, โคxsackie B, เอคโคไวรัส (echovirus) และเอนเทอโรไวรัส ๗๑ (enterovirus ๗๑ หรือ EV ๗๑)

๕. โรคเมือ เท้า ติดต่อได้อย่างไร

โรคเมือ เท้า ปาก มักติดต่อโดยการได้รับเชื้อจากอุจจาระ ฟอยล์ของน้ำมูก น้ำลาย หรือน้ำในคุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปาก การติดต่อทางน้ำหรืออาหารมีโอกาสเกิดได้น้อย การแพร่ติดต่อเกิดชื้น ค่อนข้างง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย และแม้อาการทุเลาลงแล้ว ก็ยังอาจแพร่เชื้อได้บ้าง เนื่องจาก เชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นานถึง ๖-๘ สัปดาห์

๖. ผู้ใหญ่สามารถติดโรคเมือ เท้า ปาก จากเด็กได้หรือไม่

ผู้ใหญ่มักมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้จากการได้รับเชื้อขณะเป็นเด็ก ซึ่งภูมิคุ้มกันทางนี้จะจำเพาะกับชนิดของไวรัสที่เคยได้รับเชื้อ หากได้รับเชื้อชนิดใหม่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อ ภัยสามารถเป็นโรคได้อีก ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อื่นได้

๗. หญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปากเสี่ยงติดโรคหรือไม่

ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีอาการป่วยควรรับบริการแพทย์

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแสดงว่าการติดเชื้อมีผลต่อการแท้งบุตร ความพิการของเด็ก หรือเด็กเสียชีวิตในครรภ์อย่างไรก็ตาม เด็กอาจได้รับเชื้อขณะคลอดหากมารดาป่วยในช่วงใกล้คลอด เด็กแรกเกิดที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรง

การป้องกันทำได้โดยการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี (อ่านรายละเอียดในหัวข้อ “จะป้องกันโรคได้อย่างไร”) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อรับเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างคลอด

๘. หากติดเชื้อแล้วจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่

ส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยภายใน ๓ - ๕ วันหลังได้รับเชื้อ โดยใช้เป็นอาการแสดงว่ามีการแพร่ของโรค

๙. อาการของโรคเป็นอย่างไร

เริ่มด้วยไข้ (อาจเป็นไข้สูงในช่วง ๑ - ๒ วันแรก และลดลงเป็นไข้ต่ำๆ อีก ๒ - ๓ วัน) มีจุนหรือฝีนแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ทำให้เจ็บปากไม่อยากทานอาหาร จะเกิดฝีนแดงซึ่งจะกลâyเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่อื่น เช่น ก้น หัวเข่า ฯลฯ ฝีนนี้จะกลâyเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง (maculo-papular vesicles) มักไม่คัน แต่เวลากดจะเจ็บ ต่อมมาจะแตกออกเป็นหลุมดื้ัด (ulcer) อาการจะดีขึ้นและแพลงหายไปใน ๗ - ๑๐ วัน

ในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (aseptic meningitis) ก้านสมองอักเสบ (brain stem encephalitis) ตามมาด้วยปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดล้มเหลว ทำให้เสียชีวิตได้ สัญญาณอันตรายได้แก่ ไข้สูงไม่ลดลง ชีม อาเจียนบ่อย หอบ และแขนขาอ่อนแรง เกิดภาวะอัมพาตคล้ายโอลิโว

๑๐. ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเมือ เท้า ปาก ที่รุนแรง

โดยทั่วไปโรคเมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ไม่อันตราย ในประเทศไทยพบโรคนี้ได้ปอยแต้มมีความรุนแรงผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรค ผู้ป่วยมักมีอาการป่วยเล็กน้อย หายได้เองภายใน ๓ - ๑๐ วัน และหายไม่มีผู้เสียชีวิตเลย แต่เด็กอ่อนและเด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโต

๑๑. วินิจฉัยโรคเมือ เท้า ปาก ได้อย่างไร

โดยทั่วไปแพทย์จะวินิจฉัยจากอายุ ประวัติ และอาการ โดยสังเกตลักษณะผื่นหรือตุ่มแพคต่างๆ ที่ปรากฏ รวมถึงวินิจฉัยแยกจากโรคที่มีอาการแพลงในปากอื่น ๆ เช่น โรคติดเชื้อเริมในช่องปาก ฯลฯ สำหรับการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมักไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค บ៉องตัน เพราะต้องใช้เวลานาน ๒ - ๕ สัปดาห์ เพื่อแยกและยืนยันเชื้อสาเหตุ จึงทำให้เฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง หรือมีขั้นบัน្តาระบบท่าน้ำ

๑๔. โรคนี้รักษาได้หรือไม่

รักษาได้ตามอาการ โดยที่ไปใช้การรักษาเพื่อบรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยาแก้ปวดคลายเดีมีเยาด้านไวรัชนิดนี้โดยเฉพาะ โรคนี้หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และพักผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะหายดีในวันที่ ๗-๑๐ วัน แต่ผู้ป่วยจะต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกับเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงเสียชีวิต และส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

๑๕. จะป้องกันโรคมือ เท้า ปากได้อย่างไร

โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนการรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็ก รวมถึงการไม่คุกคามใกล้ชิด ใช้ภาชนะอาหาร หรือของใช้ร่วมกับผู้ป่วย รวมกับการรักษาความสะอาดทั่วไป การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัวให้ถูกสุขาภิบาล

๑๖. หากบุตรหลานมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

แยกเด็กป่วยออกจากคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ ๕ - ๗ วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง คีม อาเจียน หอบ เป็นต้น ต้องรีบพากลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีระบบสาธารณูปโภคดี ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลาไอ或จาม และรับประทานอาหารร้อนๆ ระวังเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสจมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

๑๗. หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร

มาตรการชั่วคราวที่เกิดโรคระบาดต้องเน้นการสักดิ้นการแพร์กระยะของเชื้อ ซึ่งอาจมีความจำเป็นจะต้องประกาศเขตติดโรคและปิดสถานที่ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนเด็กเล็ก (อาจรวมถึงโรงเรียนน้ำ สถานที่แออัด ฯ) เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กป่วย และเน้นการล้างมืออย่างต่อเนื่อง การใช้ถุงมือหรือถุงมือหุ้มครั้งหลังสัมผัสจมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยง ควรดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งการระบาดไปที่หน่วยงานบริการสาธารณูปโภคในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวนการระบาดให้ความรู้ และคำแนะนำ
- เผยแพร่คำแนะนำ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ช่วยบ้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัยของสภาพแวดล้อม และควรแยกของใช้ไม่ใช่ปัจจัยกับเด็กป่วย เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มีอาการโรคมือ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน ๕ - ๑๐ วัน หรือจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น ๆ
- ควรรีบพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดห้องโรงเรียนชั่วคราว (กรณีมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายห้องเรียน) ประมาณ ๕ - ๗ วัน

- หากพบว่ามีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก หรือ มือป่วยติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส ๗๗ ในโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาให้ปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระจายในคลาสขั้นเรียนແนະนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทำความสะอาด อุปกรณ์รับประทานอาหาร, ของเล่นเด็ก, ห้องน้ำ, สรรว่ายน้ำ และให้มั่นใจว่ามีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอาหาร, ของเล่นเด็ก, ห้องน้ำ, สรรว่ายน้ำ และให้มั่นใจว่ามีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอาหาร
- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องล้อม สรรว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑ ลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด
- ทำความสะอาดด้วยเครื่องซักอบอ่าง เครื่องซักผ้าด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
- ทำความสะอาดด้วยเครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

๑๖. จะทำความสะอาดเชื้อได้อย่างไร

- เชื่อน้ำกรอกทำลายโดยแสงอุลตราไวโอเล็ตในแสงแดด ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน
- เชื่อน้ำกรอกทำลายโดยการต้มที่ ๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที
- เชื่อน้ำกรอกทำลายได้ด้วยน้ำยาซักล้างที่ไวป์, โซเดียมไฮPOCHLORITE (Sodium Hypochlorite) ๑% หรือ กูตารอลดีไฮด์ (Glutaraldehyde), ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๐.๓% และคลอรีน ผสมน้ำ ๐.๑ ppm (part per million) หากทำลายเชื้อในอุจจาระต้องใช้คลอรีนที่เข้มข้นมากกว่านี้
- เชื่อน้ำกรอกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ (pasteurization), steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma

๑๗. คลอรีนในสรรว่ายน้ำฆ่าเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ได้หรือไม่ เด็กมีโอกาสติดเชื้อโรคเนื่องจากสรรว่ายน้ำได้ไหม
ความเข้มข้นของคลอรีนในสรรว่ายน้ำตามมาตรฐานต้องมีอย่างน้อย ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (๑ ppm (part per million)) ซึ่งมีปริมาณคลอรีนเพียงพอที่จะทำลายเชื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำเด็กป่วยไปสรรว่ายน้ำ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสรรว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด

๑๘. ความเสี่ยงต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศเกิดโรคระบาดมีมากน้อยเพียงใด

ไม่มีข้อห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานว่ากำลังเกิดโรคระบาด ผู้ปกครองเด็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด รักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย และไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สรรว่ายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และควรอยู่ในที่ที่มีระบบถ่ายเทอากาศได้

๑๙. แจ้งการระบาด ได้ที่ใดบ้าง

- สำนักระบบวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. ๐-๒๔๕๘๐-๑๘๘๒, ๐-๒๔๕๘๐-๑๗๙๕
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๔๔๕-๘๗๐๖

๔๐. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ขอเอกสารและคำแนะนำได้ที่ได้บ้าง

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๖๔๕-๘๗๐๖ และ ๐-๒๓๕๕-๑๙๓๖
- สำนักระบบทดวิทยา โทร. ๐-๒๕๕๐-๑๘๘๒, ๐๒-๕๘๐๑๘๘๙
- สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๓, ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๕ และ ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๔๗

๔.๒ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๕๑๙
- เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/>
- เว็บไซต์สำนักงาน疾控 กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>


รายงานสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักงาน箧วิทยา ในปี 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 65,230 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 101.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย สัดส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง 1.074 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (30.99 %) 2 ปี (25.84 %) 3 ปี (16.22 %) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ตราด (299.75) ยะลา (245.04) ปราจีนบุรี (215.72) เชียงราย (211.51) จันทบุรี (174.01)

ในปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 พบรู้ป่วย 9,783 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.18 ต่อแสนประชากร นับผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (28.81%) 2 ปี (25.84%) 3 ปี (16.49%) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ น่าน (58.20) พะเยา (37.29) นครสวรรค์ (29.53) สมุทรปราการ (27.79) สตูล (25.50) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1: ภาพแสดงอัตราป่วยของโรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี 2557 และ ปี 2558




จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ของสำนักงาน箧วิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีการรายงานการระบาดของโรคเมือ เท้า ปากแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จำนวน 5 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน จังหวัดนนทบุรี(ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดชลบุรี(โรงเรียน) จังหวัดอุดรธานี*(ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนอนุบาลเอกชน) และจังหวัดสระบุรี(ศูนย์เด็กเล็ก) จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ราย พบรพัพนธุกรรม Enterovirus 71 จำนวน 6 ราย และ Coxsackie virus A16 จำนวน 1 ราย พbmีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลบวก เชื้อ Enterovirus 71

*จากการสอบสวนการระบาดโรคเมือ เท้า ปาก ในจังหวัดอุดรธานีของทีมเฝ้าระวังและ สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว พบรพัพนธุกรรม Enterovirus 71 จำนวน 30 ราย ใน 4 ตำบลของอำเภอจับ พbmีการระบาดของ โรคในโรงเรียนอนุบาลบ้านสร้างก่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิสุทธิ瓦ส ในตำบลสร้างก่อ มีเด็กป่วยจำนวน 24 ราย ส่วนอีก 6 ราย พบรู้ป่วยในบุนนาค 3 ตำบล ได้แก่ เมืองพี่ 4 ราย ตำบลเชียงเพียง 1 ราย และตำบลปะโคน

1 ราย อายุระหว่าง 6 เดือน - 6 ปี 7 เดือน นักศึกษาได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการในพื้นที่เกิดการระบาดจำนวน 5 ราย พบร้า 3 รายให้ผลบวกเชื้อ Enterovirus 71

รูปที่ 2: กราฟแสดงจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก จำแนกรายเดือน, เทียบกับค่าเฉลี่ยฐาน 3 ปี และ 5 ปี



ในช่วงฤดูฝนของทุกปี (พฤษภาคม – สิงหาคม) จะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของโรคเมือ เท้า ปาก อีกทั้งยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของสถานศึกษาที่เด็กจะเข้ามาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่แพร่กระจายของโรคเป็นอย่างดี หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า การแยกเด็กป่วย การทำความสะอาดห้องเรียน ที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ และของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะสามารถป้องกันควบคุมโรค ลดการป่วยและการเสียชีวิตของเด็กในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพในระยะเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2

แนวทางการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล



สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 4 สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
<http://demo.favouritedesign.com/healthypreschool/home>