



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๑๕๗๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๔๔๐๐๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๐๑  
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  
ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕ ราย และ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย  
และยังพบผลบวกสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิด<sup>ผู้เสียชีวิต</sup> ปรากฏว่า เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้  
ยังพบอีกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิตถูกสุนัขของตนเองกัด ช่วน ทั้งนี้ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน  
ตามหลักเวชศาสตร์ จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน<sup>โรคพิษสุนัขบ้า</sup> จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต<sup>โดยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบัน</sup>  
ยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล  
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที  
เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับ<sup>การรักษาที่ถูกต้อง</sup>

๓. หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปชิงไว้  
เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด<sup>เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที</sup>

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JySTuo> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการแจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล  
ในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายราตรี บุญมาก

(นายราตรี บุญมาก)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุข

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๐๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิ

# ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๐๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุลิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย และ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย และยังพบผลบวกสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตปรากฏว่า เมื่อถูกสุนัข หรือแมว กัด ช่วน และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิตถูกสุนัขของตนเองกัด ช่วน ทั้งนี้ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามหลักเวชศาสตร์ จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหันที่ เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

๓. หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปช้างไว้ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JySTuo> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิชช์ มีพีระ)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)

ผู้ประสานงาน นางสาวตันาภรณ์ ส่องแก้ว

# โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ช่วน

แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเขี้ยว

ช่วน


เลียบาดแผล



อาการผู้ป่วย

เบื้องอาหารเจ็บคอ

มีไข้ อ่อนเพลีย



ระยะแรก

ระยะตื่นเต้น

ระยะอัมพาต

- อสุจิเสียบ ใบร่าเริง
- หลุดหังง เก็บด้วง
- หวาดระแวง บ้าตามยา

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เก็บหอน

- บ้าลายโหห
- คงห้ออยตอก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอกฯลฯ เป็นพาหะนำโรค  
**ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%**

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ช่วน-เลีย




ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดิน



กักหมา - แมว



หานมอหาภัยด้ววคซีนต้อง

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน

มาตามนัดทุกครั้ง

**\*\*\*คำแนะนำสำหรับผู้เสี่ยง\*\*\***



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

อย่าแหย	อย่าเหยียบ	อย่าแยก	อย่าหยอด	อย่ายุ่ง
<b>คาด ดึง</b> กันสุนัขกัด	 ทำให้สุนัขกรีด	หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ	สุนัขที่กัดกันด้วยมือ <b>✖️</b> เปล่า	อาหารที่สุนัขกำลังกิน <b>✖️</b> กระซิบ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

# โรคพิษสุนัขบ้า

## อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สุกคุณ เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น


ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน



### อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เปื่อยอาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท  
กลั้นคลั่ง



ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจลำเหลว  
หัวใจหยุดเต้น โคง่า  
และเสียชีวิต



### ๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน  
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้  
สูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโคนกัด  
รีบไปพบแพทย์ทันที  
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน



กองสารานุสุขก้องกั่น



กองสารานุสุขก้องกั่น  
กรุณาร่วมบริจาคของกุญแจ