



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๖๐๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

ศึ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง คำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซิน
กลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๕๕๒๗

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค
โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับแจ้งข่าวจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอ
สายพันธุ์วัคซินกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (Circulating Vaccine-derived Poliovirus type 1: cVDPV1)
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอหมอก (Mok District)
แขวงเชียงขวาง (Xiengkhouang Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
และล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ในแขวงบอลิคำไซ
(Bolikhamsay Province) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบผู้ป่วยโรคโปลิโอ
สายพันธุ์วัคซินกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (cVDPV1) จำนวน ๓ ราย ในแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet
Province) จากสถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดของอย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายของเชื้อไปยังประเทศใกล้เคียง โดยจากการประเมินพื้นที่การระบาดของโรค พบว่า แขวงบอลิคำไซ
แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุรี และแขวงคำม่วน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย เลย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งมีจุดผ่านแดนบริเวณชายแดนหลายแห่งที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่พบผู้ป่วย
โดยเฉพาะด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) รวมถึงด่านพรมแดนในจังหวัด
ใกล้เคียง จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโปลิโออาจแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยจากการเดินทางข้ามชายแดน
เข้า - ออกของประชาชนชาวลาวและชาวไทย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้การแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอ
เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International
Concern: PHEIC) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) โดยกรมควบคุมโรคเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว
เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่บ่งชี้ว่า ประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาด
มายังประเทศไทยได้

จังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซิน
กลายพันธุ์ (VDPV) ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซินกลายพันธุ์ (VDPV) ให้แก่
ประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางหรือมีแผนการเดินทางจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ได้แก่ แขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ให้ติดตามสถานการณ์
การระบาดของโรคและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส
โปลิโอเข้ามาระบาดในประเทศไทย และเพื่อป้องกันควบคุมโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซินกลายพันธุ์ (VDPV)

/๒. ให้ติดตาม...


๒. ให้ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะผู้ที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่มีการเดินทาง เข้า - ออกบริเวณชายแดนเป็นประจำ โดยสอบถามและตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ หากพบว่าได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ลำช้า หรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน ให้ประสาน หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อประเมินและดำเนินการให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะ ผู้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด แนะนำให้ปฏิบัติด้านอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยผ่านความร้อน สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ต้ม น้ำดื่มที่สะอาดจากภาชนะบรรจุปิดสนิท การขับถ่ายในห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและล้างมือทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสุขา

๔. เฝ้าระวังและแจ้งเหตุผิดปกติทางสุขภาพ โดยประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว หากพบว่า ผู้เดินทางมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอให้รีบแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที เพื่อส่งต่อหน่วยบริการ สาธารณสุขให้ดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคโดยเร็ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานอำเภอ

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๕๐๓

ผู้ประสานงาน นางสาวสุมาธิกานต์ สังวาลไชย

๗
๗

จังหวัดแพร่
เลขรับ
วันที่ 2 ต.ค. 2559
เวลา
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 4094
วันที่ 2 ต.ค. 2559
เวลา



ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๕๕๓๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง คำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สร ๐๔๑๐.๘/๕๓๘๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไปว่าได้รับแจ้งข่าวจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่ ๑ (Circulating Vaccine-derived Poliovirus type 1: cVDPV1) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่อำเภอหมอก (Mok District) แขวงเชียงขวาง (Xiengkhouang Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ในแขวงบอลิคำไซ (Bolikhamxay Province) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์สายพันธุ์ที่ ๑ (cVDPV1) จำนวน ๓ ราย ในแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Province) จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไปยังประเทศใกล้เคียง โดยจากการประเมินพื้นที่การระบาดของโรค พบว่า แขวงบอลิคำไซ แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุรี และแขวงคำม่วน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย เลย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งมีจุดผ่านแดนบริเวณชายแดนหลายแห่งที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) รวมถึงด่านพรมแดนในจังหวัดใกล้เคียง จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโปลิโออาจแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยจากการเดินทางข้ามชายแดนเข้า - ออกของประชาชนชาวลาวและชาวไทย องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้การแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) โดยกรมควบคุมโรคเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่บ่งชี้ว่า ประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ระบาดเข้ามาในประเทศไทย เห็นควรขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางหรือมีแผนการเดินทางจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ได้แก่ แขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว ให้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโปลิโอเข้ามาระบาดในประเทศไทย และเพื่อป้องกันควบคุมโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV)

๗๒. ให้ติดตาม...

๒. ให้ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะผู้ที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่มีการเดินทาง เข้า - ออกบริเวณชายแดนเป็นประจำ โดยสอบถามและตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ หากพบว่าได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน ลำช้า หรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน ให้ประสาน หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อประเมินและดำเนินการให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดำเนินการตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะผู้เดินทาง เข้าไปในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโปลิโอ แนะนำให้ปฏิบัติตามอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด เช่น การล้างมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยผ่านความร้อน สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำดื่มที่สะอาด จากภาชนะบรรจุปิดสนิท การขับถ่ายในห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะและล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องสุขา

๔. เฝ้าระวังและแจ้งเหตุผิดปกติทางสุขภาพ โดยประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว หากพบว่า ผู้เดินทางมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอให้รีบแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที เพื่อส่งต่อหน่วยบริการ สาธารณสุขให้ดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมโรคโดยเร็ว

๕. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรค และการดำเนิน มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามสถานการณ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและหน่วยงาน ที่ให้บริการฉีดวัคซีนในสังกัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เดินทาง ไปยังพื้นที่เสี่ยงในประเทศลาวได้รับทราบ โดยเน้นย้ำการป้องกันตนเอง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด และการเฝ้าระวังอาการผิดปกติภายหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองโรคติดต่อทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๔๖ - ๗ สำหรับรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยสแกนได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/ ๕๓๘๒

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง คำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ได้รับแจ้งข่าวจากองค์การอนามัยโลก
เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอ สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (Circulating Vaccine-derived
Poliovirus type 1: cVDPV1) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายใหม่ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่
อำเภอหมอก (Mok District) แขวงเชียงขวาง (Xiengkhouang Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ และล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย
ในแขวงบอลิคำไซ (Bolikhamxay Province) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ ๑ (cVDPV1) จำนวน ๓ ราย ในแขวงสะหวันนะเขต
(Savannakhet Province) จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยง
ต่อการกระจายไปยังประเทศใกล้เคียง จากการประเมินพื้นที่การระบาดของโรค พบว่าแขวงบอลิคำไซ
แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุรี และแขวงคำม่วน ซึ่งติดกับจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย
เลย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดนไทย - ลาว และยังมีจุดผ่านแดน
บริเวณชายแดนหลายแห่งที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยเฉพาะด่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕
(บึงกาฬ - บอลิคำไซ) รวมถึงด่านพรมแดนจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโปลิโออาจจะ
แพร่กระจายเข้ามาระบาดของในประเทศไทยจากการเดินทางข้ามชายแดนเข้า - ออกของชาวลาว และชาวไทย
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกกำหนดการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ภายใต้กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโปลิโอเข้ามาระบาดของในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค พิจารณาแล้ว เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนสำคัญ
ที่บ่งชี้ว่าในประเทศเพื่อนบ้านมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยได้
เพื่อให้ผู้เดินทางมีความรู้ และสามารถป้องกันการติดเชื้อโปลิโอจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ
จึงขอส่งคำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์
วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้านบริเวณชายแดน (ไทย - ลาว) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/UkbVy> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขรับ 4930
17 ก.ย. 2569
เวลา.....

พร้อมแจ้งกำหนด...

พร้อมแจ้งกำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/arKUw> หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน แจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยบริการในสังกัดได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน และผู้เดินทางที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาวโดยเน้นย้ำ การป้องกันตนเอง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด และการเฝ้าระวังอาการผิดปกติภายหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายติเรก ขำแป้น)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๗

โทรสาร -



คำแนะนำ
สำหรับผู้จะเดินทาง



แผนงานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค

**คำแนะนำสำหรับผู้จะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงประเทศลาว
กรณีพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้าน
บริเวณชายแดน (ไทย – ลาว)**

*กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม 2569*

สถานการณ์และความเป็นมา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอ สายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ 1 (Circulating Vaccine-derived Poliovirus type 1: cVDPV1) รายใหม่ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอหมอก (Mok District) แขวงเชียงขวาง (Xiengkhouang Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 และล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2569 มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ในแขวงบอลิคำไซ (Bolikhamxay Province) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะแพร่กระจายเป็นวงกว้างทั้งในประเทศ รวมถึงแพร่กระจายไปยังประเทศใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบรายงานผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ 1 (cVDPV1) จำนวน 3 ราย ในแขวงสะหวันนะเขต (Savannakhet Province) จากสถานการณ์ดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่บ่งชี้ว่าในประเทศลาวมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากการประเมินพื้นที่การระบาดของโรค พบว่าพื้นที่แขวงบอลิคำไซ ที่รายงานพบผู้ป่วยมีพรมแดนติดกับประเทศไทยโดยตรง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และนครพนม นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นที่แขวงชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ แขวงบอลิคำไซ แขวงเวียงจันทน์ แขวงไชยบุรี และแขวงคำม่วน ซึ่งติดกับจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองคาย เลย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวกันพรมแดนระหว่างสองประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่เข้ามาระบาดสู่ในประเทศไทย จากการเดินทางข้ามชายแดนเข้า - ออกของชาวลาวและชาวไทย

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรค ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ขององค์การอนามัยโลก และจากแถลงการณ์การประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ว่าด้วยโรคโปลิโอ ครั้งที่ 44 (Statement of the Forty-fourth Meeting of the Polio IHR Emergency Committee) เมื่อเดือนมีนาคม 2569 โดยยังคงกำหนดการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอในระดับนานาชาติ เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโปลิโอเข้ามาระบาดในประเทศไทย และเพื่อป้องกันควบคุมโรคโปลิโอ สำหรับผู้เดินทางเข้า - ออกพรมแดนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศไทย และประเทศลาว เพื่อป้องกันโรคโปลิโอในประเทศไทย ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปประเทศลาว

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโปลิโอจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ

ข้อ 1 คำแนะนำเรื่องวัคซีนโปลิโอ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยัง พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโปลิโอ ได้แก่ แขวงบอลิคำไซ แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว หรือพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโปลิโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพำนักอยู่เป็นระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป ให้ตรวจสอบประวัติการเคยได้รับวัคซีนโปลิโอว่าครบถ้วนหรือไม่ และพิจารณาดำเนินการต่อ ดังนี้

- กรณีเด็ก เนื่องจากปกติในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขไทย แนะนำให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับวัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 2 และ 4 เดือน และต่อด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับวัคซีน) ดังนั้น หากตรวจสอบพบว่า เด็กยังได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามเกณฑ์อายุดังกล่าว ผู้ปกครองควรรีบขอคำปรึกษาจากสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อนำบุตรหลานเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด (ตามกำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ)

- กรณีวัยรุ่นและผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 15 ปี) ในกรณีที่ได้รับวัคซีนโปลิโอครั้งล่าสุด นานกว่า 12 เดือน แนะนำเข้ารับวัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) เสริม 1 ครั้ง* โดยปรึกษาแพทย์ อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ แนะนำผู้เดินทางทุกคน (ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก) ควรได้รับวัคซีนโปลิโอ ครั้งล่าสุด ภายในช่วง 4 สัปดาห์ - 12 เดือน ก่อนเดินทาง อย่างไรก็ตาม หากไม่ทัน 4 สัปดาห์ ก่อนเดินทาง ก็ยังแนะนำให้เข้ารับวัคซีนก่อนเดินทาง ซึ่งจะยังมีประโยชน์ และแนะนำรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดระหว่างเดินทางหรือพำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

หมายเหตุ

- 1) * กรณี รับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 2) สำหรับชาวต่างชาติ แนะนำให้เข้ารับวัคซีนโปลิโอให้ครบถ้วนตามคำแนะนำโดยเร็ว โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรืออาจเบิกตามเงื่อนไขสิทธิการรักษาพยาบาลที่มี
- 3) ถึงแม้กรณีไม่ได้เดินทาง ยังคงแนะนำประชาชนที่พำนักในพื้นที่ติดกับชายแดนลาว หากพบเด็กไทย อายุต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้พาเด็กเข้ารับวัคซีนโปลิโอต่อเนื่องตามกำหนดให้ครบถ้วนตามช่วงอายุโดยเร็ว สำหรับผู้ใหญ่หากต้องการเสริมภูมิคุ้มกันโปลิโอให้ตนเอง สามารถเข้ารับวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดได้ โดยสอบถามสถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ข้อ 2 เน้นย้ำมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล

ผู้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโปลิโอ ควรปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene) อย่างเคร่งครัด

- การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร
- รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ โดยผ่านความร้อน สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม
- ดื่มน้ำดื่มที่สะอาดจากภาชนะบรรจุปิดสนิท
- ขับถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องสุขา

ทั้งนี้ หากวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ผู้เดินทางมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันที เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา และเพื่อดำเนินการสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค หากสบายดี แนะนำเฝ้าระวังอาการ 14 วัน หลังกลับจากพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการไข้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โปรดไปพบแพทย์ทันที และแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทางให้แพทย์ทราบ

อ้างอิง :

1. Statement of the Forty-fourth Meeting of the Polio IHR Emergency Committee, 4 March 2026 : <https://www.who.int/news/item/04-03-2026-statement-of-the-forty-fourth-meeting-of-the-polio-ihr-emergency-committee>
2. Global Polio Eradication Initiative : <https://polioeradication.org/>
3. WHO updates polio immunization recommendations for travelers: https://polioeradication.org/news/who-updates-polio-immunization-recommendations-for-travellers/?utm_source=chatgpt.com
4. กำหนดการให้วัคซีน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2569 : https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=17937