



ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๕๘

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก
ในช่วงฤดูกาลระบาด

เรียน นายอำเภอทุกนาย นายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๗๕๕
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ด้วยได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปகครองท้องถิ่น ว่า เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในสังกัด ได้เตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค (มิถุนายน – สิงหาคม) ตามแนวทางเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก <http://beid.ddc.moph.go.th> หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๒ ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนัย ยอดนิล)

ห้องถินจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๘๔ - ๕๓๔๕๐๔ - ๕ ต่อ ๑๒



ที่ สธ ๐๔๗๖.๒/๗๗๖

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๔ เม.ย.๖๗
เลขที่ ๔๙.๔๑๑
กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๔ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สังที่ส่งมาด้วย ๑. สถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก

๒. องค์ความรู้โรคเมือ เท้า ปาก

๓. คำแนะนำ-คำตอบ โรคเมือ เท้า ปาก

๔. แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก

สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา

๒๕๑๘

วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนัก治理体系 วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๖ พบรู้ป่วยทั้งสิ้น ๔๕,๔๕๓ ราย เสียชีวิต ๕ ราย และในปี ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้รับรายงานผู้ป่วยในรหัสโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๗๗,๔๗๗ ราย จาก ๗๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๑๒.๓๙ ต่อแสนประชากร โดยกลุ่มอายุที่พบส่วนใหญ่ คือ เด็กเล็กช่วงอายุ ต่ำกว่า ๑ - ๓ ปี ซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล และยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด ของประเทศไทย รวมทั้งโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากโรคเมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเอโนโตร ซึ่งมีหลายชนิด พบได้บ่อยทั่วโลก ในกลุ่มเด็กแรกและเด็กเล็ก การระบาดมักเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยที่ว่าไปมีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยมีไข้ต่ำๆ เกิดตุ่มพองและแพลงเด็กฯ ในปาก คอ มีตุ่นที่ มือ เท้า และบริเวณก้น แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น สมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โรคนี้ติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ หรือตุ่มพองและแพลงของผู้ป่วย รวมทั้งการติดต่อทางน้ำหรืออาหาร รายละเอียดสถานการณ์ องค์ความรู้ และคำแนะนำ-คำตอบ ดังสังที่ส่งมาด้วย ๑-๓ ตามลำดับ

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคจึงเห็นควรเร่งรัดการเตรียมความพร้อมป้องกัน ควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของโรค (มิถุนายน-สิงหาคม) จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่สาธารณะ ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้การดำเนินมาตรการดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ได้จัดการประชุมปรึกษา หารือ ทบทวนแนวทาง/มาตรการ ในการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนฤดูกาลระบาด นั้น

สน.สส.
เลขที่ ๒๗๒๓
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗

สนส.
เลขที่ ๖๔๖
วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗
เวลา...
ดำเนินเพื่อ...

ดังนั้น เพื่อคิดตามฝ่ายรัฐสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิดและดำเนินการบังกันไม่ให้เกิด การเสียชีวิตและการระบาดของโรคนี้เป็นวงกว้างในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ของท่าน โปรดแจ้งหน่วยงานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค ตามแนวทาง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุชจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขอความร่วมมือป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้จากเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค <http://beid.ddc.moph.go.th> หรือโทรศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วย ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอันวัน กังเน)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการศูนย์การก่อต้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๐ ๓๙๓๙
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๓๙๓๙

สถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก

โรคเมือ เท้า ปาก มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses ที่พบในมนุษย์ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ลักษณะอาการของโรคคือ มีอาการไข้ร่วมกับตุ่มเล็กๆ ที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และปาก มักพบการป่วยในกลุ่มเด็ก อายุต่ำกว่า ๕ ปี เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีภูมิภาคและอยู่กันอย่างแออัด ส่วนใหญ่มีอาการ ๓ - ๕ วัน แต่บางรายมีอาการรุนแรงและอาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยเชื้อ Enterovirus ๗๐ เป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งทำให้เกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิต ทั้งนี้ในเด็กที่มีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิตบางรายไม่มีอาการของโรคเมือ เท้า ปาก

สถานการณ์การระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย พบรอยโรคเมือ เท้า ปาก ได้บ่อย โดยมีการรายงานโรค ดังนี้


❖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนัก kB ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ๔๕,๘๕๓ ราย อัตราป่วย ๗๗.๑๙ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๔ ราย สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง ๑ : ๐.๗๖ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ ๑ ปี (๓๑.๕๕ %) ๒ ปี (๒๕.๔๗ %) ๓ ปี (๑๗.๑๐ %) ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ เชียงราย (๒๕๕.๔๑ ต่อแสนประชากร) ยะลา (๒๒๒.๐๒ ต่อแสนประชากร) พะเยา (๒๑๓.๙๗ ต่อแสนประชากร) น่าน (๑๖๔.๒๐ ต่อแสนประชากร) พัทลุง (๑๖๗.๕๕ ต่อแสนประชากร) และจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือ จังหวัดมุกดาหาร สำหรับภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ (๑๒๐.๘๔ ต่อแสนประชากร) ภาคใต้ (๗๗.๕๗ ต่อแสนประชากร) ภาคกลาง (๖๗.๔๒ ต่อแสนประชากร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๕๗.๓๐ ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยสถานที่ที่พบการระบาดส่วนใหญ่คือ ศูนย์เด็กเล็ก ๑๙ เหตุการณ์ (๓๗%) โรงเรียนอนุบาล ๑๙ เหตุการณ์ (๓๕%) ชุมชน ๑๓ เหตุการณ์ (๒๕%) สถานสงเคราะห์ ๑ เหตุการณ์ (๒%)

❖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูลสำนัก kB ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ๗,๘๙๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๗.๓๙ ต่อแสนประชากร สัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง ๑ : ๐.๗๔ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ ๑ ปี (๓๓.๘๔ %) ๒ ปี (๒๕.๐๗ %) ๓ ปี (๑๔.๕๕ %) ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ เพชรบูรี (๓๙.๒๔ ต่อแสนประชากร) สุราษฎร์ธานี (๓๐.๖๘ ต่อแสนประชากร) จันทบูรี (๒๙.๗๕ ต่อแสนประชากร) เชียงราย (๒๙.๒๔ ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (๒๕.๖๔ ต่อแสนประชากร) สำหรับภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ (๑๔.๔๕ ต่อแสนประชากร) ภาคกลาง (๑๔.๗๑ ต่อแสนประชากร) ภาคใต้ (๑๐.๘๔ ต่อแสนประชากร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๙.๓๓ ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ

❖ สำหรับจำนวนผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปีบันทึกแล้วเดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจำนวนผู้ป่วยจะเริ่มลดลง และเพิ่มสูงขึ้นอีกรอบในเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับฤดูกาลระบาดเป็นประจำของโรคในทุกปี ส่วนพื้นที่เฉพาะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน

โดยสรุป สถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ของประเทศไทยในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบร่วมกัน ๔๕,๘๕๓ ราย ผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ที่มีอัตราป่วยสูงเพิ่มขึ้นเกือบ ๗๐ เท่าของปีที่มีอัตราป่วยต่ำสุด (พ.ศ. ๒๕๕๗) ทั้งนี้ สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากได้เพิ่มระบบเฝ้าระวังโรค ผลคืออยู่ร่วมกับโรคเมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทำให้จำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๓ - ๕ เท่าในแต่ละเดือน และสูงกว่า ๔ ปีย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม

หลังจากนั้นรีมลดลงจนถึงสิ้นปี ตลอดจนช่วงฤดูกาลระบบจะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม (รายละเอียดดังรูปที่ ๑)



รูปที่ ๑ แสดงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของจำนวนผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ของประเทศไทย

สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศ มีการรายงานการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส ๗๙ ในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชีย เช่น การระบาดในประเทศไทยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยได้หัวน้ำในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยสิงคโปร์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และประเทศไทยกัมพูชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์กรอนามัยโลกภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (WPRO) ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยภาพรวมพบว่าสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ประเทศไทยและภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก มีแนวโน้มลดลง แต่ประเทศไทยสิงคโปร์ พบระยะห่างวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก ทั้งสิ้น ๓๒๙ ราย โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น ๑๙ เท่าของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา : ๑. สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค. สรุปสถานการณ์ ปี ๕๖ รายสัปดาห์. [เข้าถึงเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗]; เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/๕๖wk/y๕๖/d๗๑_๕๓๕๖.pdf

๒. สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค. สรุปสถานการณ์ ปี ๕๗ รายสัปดาห์. [เข้าถึงเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗]; เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/๕๗wk/y๕๗/d๗๑_๐๓๕๗.pdf

๓. สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ประเทศไทย ในรอบ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๖) และการพยายามต้านทานในปี ๒๕๕๗. [เข้าถึงเมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗]; เข้าถึงได้จาก: http://www.boe.moph.go.th/files/report/๒๐๑๔๐๑๐_๖๖๘๐๕๐๐๗.pdf

๔. World Health Organization in the Western Pacific. Hand, Foot and Mouth Disease Situation Update ๒๕ February ๒๐๑๔. [Cited ๕ March ๒๐๑๔]. Available from: http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/HFMD.๒๕Feb๒๐๑๔pdf?ua=๑

องค์ความรู้โรคเมือ เท้า ปาก

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

เชื้อที่เป็นสาเหตุ : เชื้อไวรัสในลำไส้มนุษย์ กลุ่ม Enterovirus ซึ่งพบเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น และมีหลากหลายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ที่ก่อโรคเมือ เท้า ปาก ได้แก่ Coxsackie virus group A, B และ Enterovirus ๗๑

ลักษณะของโรค : ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น โดยจะปรากฏอาการดังกล่าวอยู่ ๓-๕ วัน แล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้ ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวนังบบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มแพลงในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนล้า กระพุงแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราเจ็บ อาจมีน้ำลายไหล ในบางรายอาจไม่พบตุ่มพองแต่อย่างใด แต่บางรายจะมีอาการrunny ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มี การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อจาก Enterovirus ๗๑ อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยเป็นแบบเยื่อหุ้มสมอง อักเสบแบบไม่ติดเชื้อ (aseptic meningitis) ที่ไม่รุนแรง หรือมีอาการคล้ายโปแล็ค ส่วนที่รุนแรงมากจะอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบสมองอักเสบ (encephalitis) ซึ่งมีอาการอักเสบส่วนก้านสมอง (brain stem) อาการหัวใจวาย และ/หรือภาวะน้ำท่วมปอด (acute pulmonary edema)

วิธีการแพทย์โรค : เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่น ที่เป็นเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มี เชื้อไวรัสอยู่ ทั้งนี้ เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือน (พบมากในระยะสัปดาห์แรก) ทำให้ผู้ป่วยยังคงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

ระยะเวลา : โดยทั่วไป มักเริ่มมีอาการป่วยภายใน ๓ - ๕ วันหลังได้รับเชื้อ

การรักษา : ใช้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ หรือยาทากัดปวด ในรายที่มีแพลงที่ลึกหรือกระพุงแก้ม ควรเช็คตัวผู้ป่วยเพื่อผลให้เป็นระยะ ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ ดีมีน้ำ น้ำผลไม้ และนอนพักผ่อนมากๆ แต่ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง ต้องรับวิรรรักษาเป็นผู้ป่วยใน เช่น รับประทานอาหารหรือน้ำไม่ได้ มีอาการสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ำ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายโปแล็ค จำเป็นต้องให้การรักษาแบบ intensive care และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

การป้องกันโรค :

- ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สรรว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และรอมัดระวังการไอจามรถกัน
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย
- ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน

การควบคุมโรค :

- การรายงานโรค ระบบเฝ้าระวังโรค สำนักงานสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
- การแยกผู้ป่วย ระวังสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยแม่และเด็กเกิดอาการเจ็บป่วยที่ บ่งชี้ว่า จะเป็นการติดเชื้อเอโนโรไวรัส จะต้องระวังเรื่องสิ่งขับถ่ายอย่างเข้มงวด เพราะอาจทำให้หารดติด เชื้อและเกิดอาการรุนแรงได้ ห้ามญาติหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อเอโนโรไวรัส เข้ามาในห้องผู้ป่วยหรือห้องเด็กแรกเกิด หรือห้ามเข้าใกล้ทารกหรือหญิงท้องแก้ไขลักษณะ
- การสอบถามผู้สัมผัสและค้นหาแหล่งโรค ค้นหา ติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิดในกลุ่ม เด็กอนุบาลหรือสถานเดี่ยงเด็ก
- การทำลายเชื้อ ต้องทำลายเชื้อในน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย ล้างทำความสะอาด หรือทำลายสิ่งของปนเปื้อน หลังสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนหรือสิ่งขับถ่าย
- การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส ทั้งในบ้าน สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ เช่น ห้องสrrorพสินค้า แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยแบบสบู่ หรือผงซักฟอก ปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยา ฟอกขาว เช่น คลอรอกอล์ ไอลเตอร์ ทึ้งไว้ ๑๐ นาที แล้วล้าง/เช็ด/แซ ด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของเล่นที่เด็กอาจเอาเข้าปากได้ ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอก ตามปกติ และนำไปผึ้งแಡด

คำนำ-คำตอบ
โรคมือ เท้า ปาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
๘ มกราคม ๒๕๕๗

๑. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) คือโรคอะไร

โรคมือ เท้า และปาก เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อเอนแทโรไวรัส อาการป่วย ได้แก่ มีไข้ มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม และเกิดผื่นแดง ซึ่งจะกลایเป็น คุ่มพองใส่รอบๆ แดง (มักไม่คัน เวลากดจะเจ็บ) ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า อย่างไรก็ตาม บางราย อาจไม่พบอาการตุ่มพองในปาก ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า แต่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมน้ำ และ เสียชีวิตได้ โรคนี้พบบ่อยในเด็กแรกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี พบร้อยละในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี และ น้อยมากในเด็กวัยรุ่น

๒. โรคนี้พบที่ใดบ้าง

โรคนี้พบผู้ป่วยและการระบาดได้ทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงที่มีสาเหตุจากเอนแทโรไวรัส ๗๑ ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเลเซียและบูรีน (พ.ศ. ๒๕๔๐) ไต้หวัน (พ.ศ. ๒๕๔๑) สิงคโปร์ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้น

ในประเทศไทย โรคเกิดแบบประปรายตลอดปี พบร้อยละในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศเย็นและชื้น การระบาดมักเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

๓. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) กับ โรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) แตกต่างกันอย่างไร

โรคมือ เท้า ปาก นั้นเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน ส่วนโรคปากเท้าเปื่อย เกิด จากไวรัสตัวอื่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กิน เชน โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น ทำให้สัตว์ป่วยมี อาการเป็นแพลที่ปากและกีบเท้า สัตว์ที่ป่วยมักไม่ตายหรือมีอัตราป่วยตายต่ำ ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อถึงคน โดยในอดีตเคยพบผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย มีอาการเล็กน้อยและหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษา

๔. สาเหตุของโรคมือ เท้า ปากเกิดจากอะไร

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนแทโรไวรัสชนิด ที่พบบ่อย คือ เชื้อโคxsackie A๖ (coxsackie A๖) และไวรัสอีน่า ที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ โคxsackie A๖ type อีน่า, โคxsackie B, เอกโคไวรัส (echovirus) และเอนแทโรไวรัส ๗๑ (enterovirus ๗๑ หรือ EV ๗๑)

๕. โรคมือ เท้า ติดต่อได้อย่างไร

โรคมือ เท้า ปาก มักติดต่อโดยการได้รับเชื้อจากอุจจาระ ฟอยล์ของน้ำมูก น้ำลาย หรือน้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปาก การติดต่อทางน้ำหรืออาหารมีโอกาสเกิดได้น้อย การแพร่ติดต่อเกิดขึ้น ค่อนข้างง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย และเมื่อการทุเลาลงแล้ว ก็ยังอาจแพร่เชื้อได้บ้าง เนื่องจาก เชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นานถึง ๖-๘ สัปดาห์

๖. ผู้ใหญ่สามารถติดโรคเมือ เท้า ปาก จากเด็กได้หรือไม่

ผู้ใหญ่มักมีภูมิต้านทานต่อโรคนี้จากการได้รับเชื้อขณะเป็นเด็ก ซึ่งภูมิต้านทานนี้จะจำเพาะกับชนิดของไวรัสที่เคยได้รับเชื้อ หากได้รับเชื้อนิดใหม่ที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน ก็สามารถเป็นโรคได้อีก ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรคทั้งหมด แต่อาจมีอาการเล็กน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อ่อนได้

๗. หญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปากเสียงติดโรคหรือไม่

ส่วนใหญ่หนูยังตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีอาการป่วยควรรับบริการแพทย์

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแสดงว่าการติดเชื้อมีผลต่อการแท้งบุตร ความพิการของเด็ก หรือเด็กเสียชีวิตในครรภ์อย่างไรก็ตาม เด็กอาจได้รับเชื้อขณะคลอดหากมารดาป่วยในช่วงใกล้คลอด เด็กแรกเกิดที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยรุนแรง

การป้องกันทำได้โดยการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี (อ่านรายละเอียดในหัวข้อ “จะป้องกันโรคได้อย่างไร”) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อรับเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างคลอด

๔. หากติดเชื้อแล้วจะเริ่มแสดงอาการเมื่อใด

ส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยภายใน ๓ - ๕ วันหลังได้รับเชื้อ โดยไข้เป็นอาการแสดงเริ่มแรกของโรค

๙. อาการของโรคเป็นอย่างไร

เริ่มตัวยิ่ง (อาจเป็นไข้สูงในช่วง ๑ - ๒ วันแรก และลดลงเป็นไข้ต่ำๆ อีก ๒ - ๓ วัน) มีจุดหรือผื่นแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหือก และกระเพุกแก้ม ทำให้เจ็บปากไม่อยากทานอาหาร จะเกิดผื่นแดงซึ่งจะกลایเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่อื่น เช่น กัน หัวเข่า ฯลฯ ผื่นนี้จะกลایเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง (maculo-papular vesicles) มักไม่คัน แต่เวลากดจะเจ็บ ต่อมมาจะแตกออกเป็นหลุมตื้นๆ (ulcer) อาการจะดีขึ้นและแพลหายไปใน ๗ - ๑๐ วัน

ในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เยื่องหุ้มสมองอักเสบ (aseptic meningitis) ถ้าเป็นอย่างรุนแรงจะเป็นอัคคีการณ์ (brain stem encephalitis) ตามมาด้วยปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบหัวใจและระบบปัสสาวะบวม เส้นลมหลอดเลือดที่ไปให้เลี้ยงชีวิตได้ สัญญาณอันตรายได้แก่ ไข้สูงไม่ลดลง ชีม อาเจียนบ่อย หอบ และแขนขาอ่อนแรง เกิดภาวะอัมพาตคล้ายโอลิโภ

๑๐. โครงการที่เป็นกลุ่มเตียงจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ที่รุนแรง

โดยทั่วไปโรคเมือ เห้า ปาก เป็นโรคที่ไม่อันตราย ในประเทศไทยพบโรคคนี้ได้บ่อยแต่ไม่มีความรุนแรงผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรค ผู้ป่วยมักมีอาการป่วยเล็กน้อย หายได้เองภายใน ๗ - ๑๐ วัน และแทบไม่จำเป็นต้องรักษาเลย แต่เด็กอ่อนและเด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กโต

๑๑. วินิจฉัยโรคมือ เท้า ปาก ได้อย่างไร

โดยทั่วไป แพทย์จะวินิจฉัยจากอายุ ประวัติ และอาการ โดยสังเกตลักษณะผื่นหรือตุ่มแพลงค์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ รวมถึงวินิจฉัยแยกจากโรคที่มีอาการแพลงในปากอื่น ๆ เช่น โรคติดเชื้อเริมในช่องปาก ฯลฯ สำหรับการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมักไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพราะต้องใช้เวลานาน ๒ - ๕ สัปดาห์ เพื่อแยกและยืนยันเชื้อสาเหตุ จึงทำในเฉพาะในรายที่มีอาการรุนแรง หรือยืนยันการระบาดเท่านั้น

๑๔. โรคนี้รักษาได้หรือไม่

รักษาได้ตามอาการ โดยทั่วไปใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ ยาแก้ปวด ฯลฯ แต่ไม่มียาต้านไวรัสชนิดนี้โดยเฉพาะ โรคนี้หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้และพักผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและหายได้อ่องในช่วง ๗-๑๐ วัน แต่ผู้ดูแลเด็กควรดูแลเด็กป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กแรก เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงเสียชีวิต และส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

๑๕. จะป้องกันโรคเมื่อ เท้า ปากได้อย่างไร

โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนการรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็ก รวมถึงการไม่คลุกคลีใกล้ชิด ใช้ภาชนะอาหาร หรือของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ร่วมกับการรักษาความสะอาดหัว瓜ไป การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ

๑๖. หากบุตรหลานมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

แยกเด็กป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ ๕ - ๗ วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรสังเกตอาการ ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง จีบ อาเจียน หอบ เป็นต้น ต้องรีบพากลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สรรว่ายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีระยะห่างถ่ายเทอากาศได้ดี ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลา外出 และระมัดระวังการไอจามรดกัน และผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

๑๗. หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร

มาตรการชั่ว tempo ที่เกิดโรคระบาดต้องเน้นการสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่งอาจมีความจำเป็นจะต้องประกาศเขตติดโรคและปิดสถานที่ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนเด็กเล็ก (อาจรวมถึงสรรว่ายน้ำ สถานที่แออัด ฯ) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยกันเด็กป่วย และเน้นการล้างมืออย่างต่อเนื่อง การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลและบ้านเรือนที่มีผู้ป่วย ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยง ควรดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งการระบาดไปที่หน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวนการระบาดให้ความรู้ และคำแนะนำ
- เผยแพร่คำแนะนำ เรื่องโรคเมื่อ เท้า ปาก แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัยของ สภาพแวดล้อม และควรแยกของใช้ไม่ใช่ปะปนกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ
- เฝ้าระวังโดยตรวจเด็กทุกคน หากพบคนใดที่มีอาการโรคเมื่อ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออกและให้หยุดเรียน ๗-๑๐ วัน หรือจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น ๆ
- ควรรีบพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดห้องเรียนชั่วคราว (กรณีมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือ หลายชั้นเรียน) ประมาณ ๕-๗ วัน
- หากพบว่ามีการระบาดของโรคเมื่อ เท้า ปาก หรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อโอนเทอร์ไวรัส ๗ ในการเรียน

- หรือศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาให้บีดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระจายในคลาสชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทำความสะอาด อุปกรณ์รับประทานอาหาร, ของเล่นเด็ก, ห้องน้ำ, สารวายน้ำ และให้น้ำใจว่าน้ำมีระดับคลอรินที่ไม่ต่างจากมาตรฐาน
- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สารวายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑ ลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด
 - ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ้งแผลให้แห้ง
 - หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

๑๖. จะทำลายเชื้อได้อย่างไร

- เชื้อนี้ถูกทำลายโดยแสงอุլตราชีวิวัฒนา ไอโอดีนในแสงแดด ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน
- เชื้อนี้ถูกทำลายโดยการต้มที่ ๕๐-๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที
- เชื้อนี้ถูกทำลายได้ด้วยน้ำยาซักล้างทั่วไป, โซเดียมไฮPOCHLORITE (Sodium Hypochlorite) ๑% หรือ กลูตารอลดีไฮด์ (Glutaraldehyde), ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๐.๓% และคลอริน ๘๐ mg/L (part per million) หากทำลายเชื้อในอุจจาระจะต้องใช้คลอรินที่เข้มข้นมากกว่านี้
- เชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ (pasteurization), steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma

๑๗. คลอรินในสารวายน้ำฆ่าเชื้อโรคมีอ แท้ ปก ได้หรือไม่ เด็กมีโอกาสติดเชื้อโรคนี้จากสารวายน้ำได้ไหม
ความเข้มข้นของคลอรินในสารวายน้ำตามมาตรฐานต้องมีอย่างน้อย ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (๑ ppm (part per million)) ซึ่งมีปริมาณคลอรินเพียงพอที่จะทำลายเชื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำเด็กป่วยไปสารวายน้ำ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสารวายน้ำอย่างเคร่งครัด

๑๘. ความเสี่ยงต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศเกิดโรคระบาดมีมากน้อยเพียงใด

ไม่มีข้อห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานว่ากำลังเกิดโรคระบาด ผู้ปกครองเด็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด รักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย และไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สารวายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และควรอยู่ในที่ที่มีระบบถ่ายเทอากาศได้ดี

๑๙. แจ้งการระบาด ได้ที่ใดบ้าง

- สำนักระบบทวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. ๐-๒๔๕๐-๑๗๔๒, ๐-๒๔๕๐-๑๗๔๕
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๔๕-๔๑๐๖

๒๐. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ขอเอกสารและคำแนะนำได้ที่เด็กน้ำ

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๔๕๕-๔๗๐๖ และ ๐-๒๓๕๕-๑๘๓๖
- สำนักกระบาดวิทยา โทร.๐-๒๔๕๐-๑๔๔๒, ๐๒-๕๕๐๑๙๕๗
- สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐-๒๔๕๐-๓๑๕๕

๔.๒ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
- เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค <http://beid.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>

แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันความคุมภัยระบบของโรคเมือ เท้า ปาก
สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

การเฝ้าระวังโรค

๑. ในจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาด

ให้ครุทำทำการคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยดูแลในปากและผิวตุ่นน้ำที่ฝ่ามือ เมื่อพบความผิดปกติให้พับแพทช์เพื่อการวินิจฉัย หากพบว่าเป็นโรคเมือ เท้า ปากให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ร่วมกับดำเนินมาตรการอื่นๆตามแนวทางการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เท้า ปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

๒. ในจังหวัดที่มีการระบาด หรือโดยเฉพาะอำเภอที่รับผิดชอบ

ให้ครุทำทำการคัดกรองเด็กทุกเช้า

- หากพบแพลในปาก (เด็กจะบ่นว่าเจ็บปาก กินไม่ได้) ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เด็กหยุดเรียน ๑ สัปดาห์ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีเพียงอาการแพลในปากเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผื่นตามมือ หรือเท้าก็ได้และสามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กคนอื่นๆและในสิ่งแวดล้อมได้
- ควรประสานกับผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มทราบข่าวว่ามีการระบาดในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ปกครองช่วยทำการเฝ้าระวังการป่วยในเด็ก และแจ้งโรงเรียนเมื่อเด็กมีอาการแพลในปากโดยเฉพาะในรายที่มีไข้สูงต้องรีบนำไปพบแพทย์ (โดยอาจจะยังไม่มีแพลในปาก) เนื่องจากเด็กกลุ่มที่จะมีอาการรุนแรงมากมีอาการไข้สูงร่วมด้วย โดยที่เด็กอาจจะมีหรือไม่มีแพลในปากก็ได้

การดำเนินงานควบคุมและป้องกันการระบาดโรคเมือ เท้า ปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

๑. ก่อนเปิดภาคเรียน

๑.๑ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ต่างๆ

๑.๒ จัดเตรียมสิ่งของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น รวมทั้งพยายามจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วม

๑.๓ แนะนำครุ เรื่องโรคเมือ เท้า ปาก และอนามัยส่วนบุคคล และเตรียมการกรณีเกิดการระบาดในโรงเรียน

๒. ช่วงเปิดภาคเรียน

- ๒.๑ เผยแพร่ให้คำแนะนำ ความรู้เรื่องโรคเมือ เท้า ปากแก้ผู้ป่วย รวมทั้งให้ผู้ป่วยรองช่วยสังเกตอาการเด็กตั้งแต่นิ่นๆ
- ๒.๒ ควรดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาด ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีการห้ามเข้าในอุจจาระ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง
- ๒.๓ ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หม่นล้างมือบ่อย ๆ และตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนการปฐมภาระ ภายหลังการขับถ่าย หรือสัมผัสน้ำนม น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก
- ๒.๔ เมื่อร่วงโดยตรวจเด็กก่อนเข้าห้องเรียน ถ้ามีอาการป่วย มีไข้ หรือมีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็กป่วยอยู่ห้องพยาบาล ติดต่อให้ผู้ป่วยพากลับบ้านและไปพบแพทย์ โดยทัวไปอาการโรคเมือ เท้า ปาก จะไม่รุนแรงและสามารถหายเป็นปกติได้ภายใน ๗-๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ชีม อาเจียน หอบ ต้องรับน้ำเด็กกลับไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาด หากพบตุ่มในปาก โดยยังไม่มีอาการอื่น ให้เด็กหยุดเรียนอยู่บ้านได้เลย
- ๒.๕ กรณีมีเด็กป่วย

- ให้แจ้งรายงานโรคเจ้าน้ำที่สาธารณสุข และขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค เพิ่มความถี่การทำความสะอาดสิ่งของที่เด็กจับต้องเป็นประจำ เช่น ของเล่น พื้นห้อง ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาอย่างน้อยวันละครั้ง (ไม่ใช่แค่การด้วยน้ำกวาดหรือใช้ผ้าเช็ด) สำหรับโรงเรียนที่มีของเล่นจำนวนมาก ไม่สามารถทำความสะอาดของเล่นอย่างทั่วถึงได้ทุกวัน ขอให้ลดจำนวนของเล่นสำหรับเด็กในแต่ละห้องให้เหลือเฉพาะขั้นที่ใช้บ่อยๆ และถ้าเป็นตุ๊กตาผ้า (ซึ่งไม่สามารถล้างได้โดยง่าย) อาจงดไม่ให้เด็กเล่นในช่วงที่มีการระบาด รวมทั้งเปิดประตูหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องถึง และดูแลให้ระวังน้ำมีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคือ ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ๑ ppm (part per million)
- ให้เด็กและครูที่ดูแลมีการล้างมือมากขึ้น โดยเฉพาะการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง และไม่ควรให้สบู่อยู่ในสภาพแพร่กระจายเป็นการทำให้เชื้อติดอยู่ในก้อนสบู่และแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆ ได้มากขึ้น
- ลดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กแต่ละห้อง เท่าที่จะเป็นไปได้
- แยกของใช้ส่วนตัวของเด็ก เช่น แก้วน้ำ แบ่งสีฟัน ช้อน และผ้าเช็ดมือ
- แจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนและหน่วยงานสาธารณสุขทุกวันที่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าข่ายการเฝ้าระวัง เพื่อให้เจ้าน้ำที่สาธารณสุขให้ดำเนินการประสานงานเพื่อให้สุขศึกษาแก่ชุมชน ในการลดการเล่นคลุกคลีในเด็ก (เน้นเนื้อหาให้เด็กที่ไม่ป่วยไม่ไปเล่นคลุกคลีกับเด็กบ้านอื่นๆ เพราะไม่รู้ว่าใครบ้างที่ป่วย) จนกว่าพัฒนาระบادในชุมชนนั้นๆ

- ๒.๖ หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หรือปิดโรงเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก

๓. พฤติกรรมอนามัยที่ดี ช่วยในการป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงโรคเมือ เท้า ปาก ได้แก่

- ๓.๑ ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณชนที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ๆ เช่น สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด และสรงว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการ监督管理อย่างเข้มงวดได้ดี

- ๓.๒ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังหยิบจับอาหาร หรือเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ๓.๓ ไม่ใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ขอน แก้วน้ำ หรือหลอดดูดร่วมกัน และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร
- ๓.๔ ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก เมื่อไอหรือจาม และล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระวังการอุจาระกัน

๔. การแจ้งการระบาด ขอเอกสาร และคำแนะนำได้ที่

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๖๔๕-๘๗๐๖ และ ๐-๒๓๕๕-๑๔๓๖
- สำนักโรคติดต่อ วิทยา โทร. ๐-๒๕๕๐-๑๙๙๒, ๐-๒๕๕๗-๘๕๗๙
- สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โทร. ๐-๒๕๕๐-๓๗๕๙

๔.๒ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อ วิทยา กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก

สำหรับผู้ปกครอง

- พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรแนะนำสุขอนามัยส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน และผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะ การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย
- การรักษาสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร เช่น การใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำร่วมกัน
- ควรให้เด็กอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด
- หากบุตรหลานมีอาการป่วยที่สงสัยโรคเมือ เท้า ปาก ให้พาไปพบแพทย์

สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก

- ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร รวมทั้งห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสถานที่ เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ รวมทั้งการทำจัด อุจจาระให้ถูกต้องและล้างมือบ่อยๆ
- โรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็ก ควรเพิ่มเติมความรู้เรื่องโรคและการป้องกันตนเอง เช่น ไม่คลุกคลี ใกล้ชิดกับเด็กป่วย การล้างมือและการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล และจำเป็นต้องจัดเตรียมสิ่งของ เครื่องใช้ของเด็ก แยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร
- จัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องส้วม
- หากพบผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า ๒ คน อาจพิจารณาปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาชั่วคราว เป็นเวลา ๕ วัน เพื่อทำความสะอาดและลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค และสิ่งสำคัญที่โรงเรียน อนุบาลและศูนย์เด็กเล็กควรให้ความสำคัญ คือ การแนะนำครู เรื่อง โรค เมือ เท้า ปาก และอนามัย ส่วน บุคคล และเตรียมการกรณีเกิดการระบาดในโรงเรียน

สำหรับครูและพี่เลี้ยงเด็ก

- เผยแพร่ ให้คำแนะนำ ความรู้เรื่องโรคเมือ เท้า ปากแก่ผู้ปกครอง และนักเรียน
- ผู้ดูแลเด็กต้องรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีหมั่นล้างมือบ่อย ๆ และตัดเล็บให้สั้น ล้างมือให้สะอาดทุก ครั้งก่อนการปรุงอาหาร ภายหลังการขับถ่าย หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็ก
- เฝ้าระวังโดยตรวจเด็กก่อนเข้าห้องเรียนหากพบเด็กมีอาการป่วยซึ่งสงสัยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก ควรรับ พาไปพบแพทย์ทันที และแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิดกับเด็กป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่มี การระบาด หากเด็กมีตุ่มในปาก โดยที่ยังไม่มีอาการอื่น ให้หยุดเรียนให้เด็กที่ป่วยขับถ่ายอุจจาระลงใน ที่รองรับแล้วนำไปกำจัดให้ถูกสุขาภิบาลในส้วม
- หากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น ไม่ยอมดื่มน้ำด้วยตัวเองพาไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลทันที และแจ้งรายงานโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและขอรับคำแนะนำในการควบคุมโรค รวมทั้งแจ้งรายชื่อ และที่อยู่เด็กที่เข้าช่วยเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก ให้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนและ หน่วยงานสาธารณสุขทุกวันที่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้าช่วยการเฝ้าระวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ ดำเนินการประสานงานเพื่อให้สุขศึกษาแก่ชุมชนในการลดการเล่น คลุกคลีในเด็ก (เน้นเนื้อหาให้เด็กที่

ไม่ป่วยไม่ไปเล่นคลุกคลีกับเด็กบ้านอื่น เพราะไม่รู้ว่าใครบังที่ป่วย) จนกว่าพั้นระยะเวลาดีในชุมชนนั้นๆ

การทำความสะอาดพื้นเพื่อย่างเชื้อโรค

- เด็กที่ป่วยได้ส้มผัส ห้ในบ้าน สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยแบบสบู่ หรือผงซักฟอกปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว เช่น คลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทึ้งไว้ ๑๐ นาที และล้าง/เช็ด/แซ่ ด้วยน้ำสะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของเส้นที่เด็กอาจเข้าไปได้ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ และนำไปสูงแฉดให้แห้ง

สำหรับประชาชนทั่วไป

- ควรรักษาความสะอาด โดยล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างก่อนรับประทานอาหารและหลัง การขับถ่าย
- สังเกตอาการผิดปกติของเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการสงสัยโรคเมือ เท้า ปาก หรือมีไข้สูงอย่างน้อย ๒ วัน ร่วมกับอาการอาเจียน หอบเหนื่อย ซึม ซัก กล้ามเนื้อกระดูก หรือมีอาการแยลง ควรไปพบแพทย์ แม้จะไม่มีพื้นที่นัดหมาย

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคเมือ เท้า ปาก
หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มากภายในพื้นที่อันจำกัด เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรค ไม่ว่าจะเป็นสถานที่กลางแจ้งหรือในร่ม ควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน

๑. ผู้จัดงานหรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลคำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงานหรือกิจกรรมล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายแจ้งข่าว การลงคำแนะนำในหนังสือพิมพ์ มุนนิทรรศการ รวมทั้งการประกาศในงาน

๒. ผู้จัดงานควรคำนึงถึงความสะอาดในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น

- ทำป้ายคำแนะนำ หรือหน่วยบริการให้คำแนะนำผู้ที่มีอาการสงสัยโรคเมือ เท้า ปาก บริเวณทางเข้างาน
- จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษทิชชู ในห้องน้ำให้พอเพียง
- จัดให้มีการคุ้มครองความสะอาด ทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม โดยเน้นการล้าง ทำความสะอาด อุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ อ่างล้างมือ рагบันได โต๊ะ เก้าอี้ การทำความสะอาดโดยการล้างด้วยสบู่ หรือ ผงซักฟอก แล้วล้างออกด้วยน้ำ และใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอริน เช่น คลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทึ้งไว้ ๑๐ นาที และล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ในอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เด็กสามารถนำเข้าปากได้ เช่น ของเล่น ให้ล้างด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก แล้วล้างออกด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้ง หรือผึ่งแดดให้แห้ง โดยทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สม่ำเสมอและบ่อย กว่าในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ใช้ด้านหลังของลำตัวผลักประตูออกได้ จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค)

- จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคเมือ เห้า ปาก โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้ง อำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
- ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุมจำหน่ายอาหาร

คำแนะนำสำหรับผู้มาร่วมกิจกรรม

- จัดให้ครุพี่เลี้ยง/ครุผู้ดูแลเด็ก ตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หากพบเด็กมีไข้ มีแพลในปาก พบรุดหรือผื่นแดง ฝ้าเมือง ฝ้าเท้า หรือมีอาการสงสัยเป็นโรคเมือ เห้า ปาก ควรแนะนำให้แยกเด็กออกไม่ให้ปะปนกับเด็กปกติ ไม่ควรเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกับคนหมุ่นมาก ควรให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านหรือไปพบแพทย์
- จัดให้ครุพี่เลี้ยง/ครุผู้ดูแลเด็ก สังเกตเด็กที่มีไข้สูงร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ อาเจียน หอบเหนื่อย ซึม กระตุก ชัก หรือสังเกตว่าเด็กมีอาการเยิ่ลง ให้รีบนำไปพบแพทย์เมื่อควรนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม หรือ พาไปสถานที่แอดอัต
- ผู้ที่มีอาการสงสัยโรคเมือ เห้า ปาก เช่น มีไข้ มีแพลที่ปาก มีคุ้มแดงที่ฝ้าเมือง ฝ้าเท้า ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่ควรให้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมกับคนหมุ่นมาก และสถานที่แอดอัต
- ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคเมือ เห้า ปาก จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมุ่นมาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก
- ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากปิดจมูก หากไม่มีหรือหิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปประอะเปื้อนตามสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ใจหายได้แน่เสื่อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี
