



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๔๖๔

ศาลากลางจังหวัดแพร
ถนนไชยบูรณ์
พ.ร ๕๔๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบบด

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร และนายเทศมนตรีเมืองแพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๓๒๗

ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบบด (ฤดูฝน ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม) เนื่องจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก ของสำนักงานระบบดิจิทัล กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๗ พบรู้ป่วยทั้งสิ้น ๖๕,๒๓๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และในปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๕,๗๘๓ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔.๑๙ ต่อแสนประชากร พบรุกในกลุ่มอายุ ๐-๕ ปี ซึ่งเด็กอายุ ๐-๑ ปี ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ ๒-๕ ปี ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการป่วยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปสู่เด็กคนอื่นๆ ได้ง่าย และเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๕

www.phraaelocal.go.th

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร

ครัวเรือนพ่อแม่
ที่ มท ๐๔๙๓.๔/ว ๘๒๗๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๗๗.๑๖/๒๐๒๗

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. องค์ความรู้โรคเมือ เท้า ปาก

จำนวน ๑ ชุด

๓. คำตาม - คำตอบ โรคเมือ เท้า ปาก

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย แจ้งขอความร่วมมือในการดำเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด เนื่องจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก
ของสำนักระบบทวิภาคี กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๗ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น ๖๕,๒๓๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และในปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๔,๗๗๓ ราย
มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คิดเป็น อัตราป่วย ๗๕๘ ต่อแสนประชากร พbmakในกลุ่มอายุ ๐ - ๕ ปี ซึ่งเด็กอายุ ๐ - ๑ ปี
ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี ส่วนใหญ่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการป่วยและการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อไปสู่เด็กคนอื่น ๆ ได้ง่าย โดยสามารถสรุปความเป็นมาและสาระของการขอความร่วมมือ ดังนี้

๑. โรคเมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทโรไวรัส (Enterovirus, EV 71) ซึ่งเป็นเชื้อสำคัญ
ที่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคในกลุ่มเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี แม้ว่าส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรง คือ ผู้ป่วย
มีอาการไข้ต่ำ ๆ มีคุณแดงที่ลิ้น เหงื่อก กระทุ้งแก้ม ฝ้ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และบริเวณก้น แต่บางรายอาจมีอาการ
รุนแรงและเสียชีวิตได้ หากมีอาการสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง
ทางน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้เด็ก
คลุกคลีกับเด็กป่วยหรือใช้อุปกรณ์ของเด่นต่าง ๆ ร่วมกับเด็กป่วย ดังนั้น การตรวจคัดแยกเด็กป่วยและการดูแล
ความสะอาดอุปกรณ์ของเด่นของเด็กต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการป้องกันการเจ็บป่วยและการระบาดของโรค

๒. เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก (เดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคม) และเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง กระทรวงสาธารณสุข
จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยประสานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อม
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก อย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา และชุมชน ดังนี้

๒.๑ สำหรับศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษา

(๑) แจ้งการระบาดไปที่หน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ไปสอบสวนการระบาด ให้ความรู้และคำแนะนำ

๒) เมยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคเมือ เท้า ปาก แก้ผู้ป่วยครองและเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขภาพอนามัยของสภาพแวดล้อม และควรแยกและของใช้ไม่ได้ไปปะปนกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ

๓) เป้าระวัง โดยตรวจเด็กทุกคน หากพบเด็กที่มีอาการโรคเมือ เท้า ปาก ต้องรีบแยกออกจากห้องเรียน ๗ - ๑๐ วัน หรือจนกว่าจะหายบวม เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น ๆ

๔) ควรรับพยาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

๕) พิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดห้องโรงเรียนชั่วคราว (กรณีมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายชั้นเรียน) ประมาณ ๕ - ๗ วัน

๖) หากพบว่ามีการระบาดของโรคเมือ เท้า ปาก หรือมีผู้ป่วยติดเชื้อเอนแทโรไวรัส ๗๙ ในโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก ให้พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระจายในหลายชั้นเรียน แนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์รับประทานอาหาร ของเล่นเด็ก ห้องน้ำ สรรว่ายน้ำ และให้มั่นใจว่าน้ำมีระดับคลอรินที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน

๗) ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สรรว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว (๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑ ลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด

๘) ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง

๙) หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

๒.๒ สำหรับประชาชนทั่วไป (พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก)

๑) ควรตรวจสุขภาพร่างกายเด็กเบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน

๒) ควรรักษาความสะอาดโดยล้างมือทุกครั้ง ก่อนการเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย

๓) หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของใช้ร่วมกัน เช่น การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ และแปรงสีฟันร่วมกัน เป็นต้น

๔) เมื่อเด็กป่วยให้หยุดพักรักษาอยู่บ้าน ไม่ควรไปคลุกคลีหรือเล่นกับบุคคลปกติ ที่ร่วงเป็นภัยที่อาจหายป่วย (ประมาณ ๕ - ๗ วัน)

๕) สังเกตอาการผิดปกติของเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการสงสัยโรคเมือ เท้า ปาก หรือมีไข้สูง อุ่นน้อย ๒ วัน ร่วมกับอาการอาเจียน หอบเหนื่อย จี๊ม ชัก กล้ามเนื้อกระตุก หรือมีอาการเหลือง ควรไปพบแพทย์ แม้ว่าจะไม่มีผื่นขึ้นก็ตาม

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาดของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือ จังหวัด แจ้งกำชับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบให้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาด

ของโรคดังกล่าว โดยสามารถขอเอกสารและคำแนะนำได้จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th> หรือสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค <http://thaigcd.ddc.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๗๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๗๖

ด่วนพิสูจน์

ที่ สส ๐๔๗๒.๑๖/ ๙๙๐๘



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลราชบاد

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย จำนวน ๑ ชุด

๒. งบประมาณรู้โรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๑ ชุด

๓. คำถาย - คำตอบโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๑ ชุด

๔. แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่อธิบดีกรมการเฝ้าระวังโรคเมือ เท้า ปาก จากสำนักงานสาธารณสุขไทย กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๗ พงผู้ป่วยห้สั่น ๖๕,๗๓๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย และในปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีรายงานผู้ป่วยโรคเมือ เท้า ปาก จำนวน ๕๕๘๓ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๕.๗๘ ต่อแสนประชากร พbmมากในกลุ่มอายุ ๐ - ๕ ปี ซึ่งเด็กอายุ ๐ - ๑ ปี ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ซึ่งมีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการป่วยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปสู่เด็กคนอื่นๆได้ง่าย โรคเมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร (Enterovirus, EV ๗๑) ซึ่งเป็นเชื้อสำคัญที่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคในกลุ่มเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี แม้ว่าส่วนใหญ่อาการของโรคจะไม่รุนแรง คือ ผู้ป่วยมีอาการไข้ต่ำๆ มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหือก กระเพung ฝัน เมื่อมือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และบริเวณก้น แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ หากมีอาการสมองอักเสบหรือถลามเนื้อหัวใจอักเสบ โรคนี้ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงทางน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากทุพพลอยและแพล หรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้เด็กสูกคลีกับเด็กป่วย หรือใช้อุปกรณ์ของเด่นต่างๆ ร่วมกับเด็กป่วย ด้วยน้ำ การตรวจคัดแยกเด็กป่วยและการดูแลความสะอาดอุปกรณ์ ของเด่นของเด็ก ภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการเจ็บป่วยและการระบาดของโรค นั้น

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า ด้วยขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาล ซึ่งเป็นฤดูกาลราชบัตร ของโรคเมือ เท้า ปาก (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม) เพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการระบาดอย่างเป็นวงกว้าง ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือประธาน และแข้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับดำเนินการ เตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเมือ เท้า ปาก อย่างเข้มข้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอันวัย กันนະ)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้ดูแลกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๓๑๘๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๓๑๘๓


รายงานสถานการณ์โรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 5 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนักงาน疾控中心 ในปี 2557 มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 65,230 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 101.20 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย สัดส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิง 10.74 กู้มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (30.99 %) 2 ปี (25.84 %) 3 ปี (16.22 %) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ตราด (299.75) ระยอง (245.04) ปราจีนบุรี (215.72) เชียงราย (211.51) จันทบุรี (174.01)

ในปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 พบผู้ป่วย 9,783 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15.18 ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 1 ปี (28.81%) 2 ปี (25.84 %) 3 ปี (16.49 %) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ น่าน (58.20) พะเยา (37.29) นครสวรรค์ (29.53) สมุทรปราการ (27.79) สตูล (25.50) ตามลำดับ ตัวแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1: ภาพแสดงอัตราป่วยของโรคเมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี 2557 และ ปี 2558




จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณ์ของสำนักงาน疾控中心 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2558 มีการรายงานการระบาดของโรคเมือ เท้า ปากแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) จำนวน 5 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน จังหวัดนนทบุรี(ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดชลบุรี(โรงเรียน) จังหวัดอุดรธานี*(ศูนย์เด็กเล็ก) จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนอนุบาลเอกชน) และจังหวัดสระบุรี(ศูนย์เด็กเล็ก) จำนวนทั้งสิ้น 45 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ราย พบรพัณธุกรรม Enterovirus 71 จำนวน 6 ราย และ Coxsackie virus A16 จำนวน 1 ราย พbmีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กเพศหญิง อายุ 4 ปี 10 เดือน ให้ผลบวกเชื้อ Enterovirus 71

*จากการสอบสวนการระบาดโรคเมือ เท้า ปาก ในจังหวัดอุดรธานีของทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว พบรพัณธุกรรม จำนวน 30 ราย ใน 4 ตำบลของอำเภอภูดี พบมีการระบาดของโรคในโรงเรียนอนุบาลบ้านสร้างก่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิสุทธาราษ ในตำบลสร้างก่อ มีเด็กป่วยจำนวน 24 ราย ส่วนอีก 6 ราย พนผู้ป่วยในชุมชนจาก 3 ตำบล ได้แก่ เมืองเพียง 4 ราย ตำบลเชียงเพียง 1 ราย และตำบลป่าโค

1 ราย อายุระหว่าง 6 เดือน - 6 ปี 7 เดือน นักเรียนนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่เกิดการระบาดจำนวน 5 ราย พบร่วม 3 รายให้ผลบวกเชื้อ Enterovirus 71

รูปที่ 2: กราฟแสดงจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก จำนวนรายเดือน, เพียงกับค่ามัธยฐาน 3 ปี และ 5 ปี



ในช่วงฤดูฝนของทุกปี (พฤษภาคม – สิงหาคม) จะเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุดของโรคเมือ เท้า ปาก อีกทั้งยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ของสถานศึกษาที่เด็กจะเข้ามาอยู่ร่วมกันจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นสถานที่แพร่กระจายของโรคเป็นอย่างตี หากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลมีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้า การแยกเด็กป่วย การทำความสะอาดห้องเรียน ที่นอน อุปกรณ์เครื่องใช้ และของเส้นเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะสามารถป้องกันควบคุมโรค ลดการป่วยและการเสียชีวิตของเด็กในสถานที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพในอนาคตเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2

องค์ความรู้โรมีอ เท้า ปาก

เชื้อที่เป็นสาเหตุ : เชื้อไวรัสในกลุ่ม Enterovirus ซึ่งพบเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น และมีหลากหลายสายพันธุ์ สำหรับสายพันธุ์ที่ก่อโรคเมือ เท้า ปาก ได้แก่ Coxsackie virus group A, B และ Enterovirus ฯลฯ

ลักษณะของโรค : ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น โดยจะปรากฏอาการดังกล่าวอยู่ ๓-๕ วัน แล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้ ร้าวทับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวนังบวมเร็ว ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มแพคในปาก ส่วนใหญ่พบที่เหตุน่อง อ่อน ถี่น กระหุงแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารพยายามเข็บ อาจมีน้ำลายไหล ในบางรายอาจไม่พบตุ่มพองแต่อย่างใด แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นง่ายกับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อจาก Enterovirus ๗๑ อาจมีอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตได้ จากสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ก้านมีเนื้อหัวใจอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ำ เป็นต้น

วิธีการแพร่โรค : เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่น ที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากคุ้มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสอยู่ ทั้งนี้ เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือน (พบมากในระยะสัปดาห์แรก) ทำให้ผู้ป่วยยังคงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

ระยะฟักตัว : โดยทั่วไป มักเริ่มมีอาการบ่ายกาญใน ๓ - ๕ วันหลังได้รับเชื้อ

การรักษา : ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสใช้ในการรักษาเป็นการเฉพาะ การรักษาจึงเป็นแบบประคับประคอง เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ให้ยาลดไข้ การเข็มตัวผู้ป่วยเป็นระยะๆ หายาชาหรือยาลดการอักเสบบริเวณ แผลที่ถูกต้องหรือการพักผ่อนแก้ม ให้เต้มน้ำ น้ำผลไม้เย็นๆ ไอศครีม เพื่อลดอาการเจ็บแสบ ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ และนอนพักผ่อนมากๆ ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น รับประทานอาหารหรือน้ำมื้อเดียว ใช้สูง ชี้ม มีอาการเกร็ง ชัก กระตุก กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากหอบ กระสับกระส่าย ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที เพราะจำเป็นต้องรับวิตามินและรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การป้องกันโรค :

- หลักเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และรับมือด้วยการไอจามรถกัน
 - ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน
 - ถังมือให้สะอาดทุกรั้งก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย
 - ถังมือให้สะอาดทุกรั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมการลอกเล่นต่างๆ ของเด็ก
 - หมั่นดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ และของเส้นต่างๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 - หมั่นดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ (รับประทานอาหารที่สด สะอาด สุกในที่ๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ อาบน้ำชำระร่างกายทุกวัน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ)
 - หลีกเลี่ยงการนำเด็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน หรือโรงพยาบาล เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น

คำถ้าม - คำดอบ โรคมือ เท้า ปาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) คือโรคอะไร

โรคมือ เท้า และปาก เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อเอนแทโนไวรัส อาการป่วย ได้แก่ มีไข้ มีจุดหรือผื่นแดงยกเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระเพุ่งแก้ม และเกิดผื่นแดง ซึ่งจะกลایเป็น ตุ่มพองใส่รอบๆ แดง (มักไม่คัน เลากัดจะเจ็บ) ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ และฝ่าเท้า อย่างไรก็ตาม บางราย อาจไม่พบอาการทุ่มพองในปาก ฝ่ามือ หรือฝ่าเท้า แต่มาด้วยภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวมน้ำ และ เสียชีวิตได้ โรคนี้พบบ่อยในเด็กแรกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี พบร้อยละในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี และ น้อยมากในเด็กวัยรุ่น

๒. โรคนี้พบที่ใดบ้าง

โรคนี้พบปูร์ป่วยและการระบาดได้ทั่วโลก มีรายงานการระบาดรุนแรงที่เมืองใหญ่จากเอนแทโนไวรัส ๗๙ ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น มาเตเชยและบูรีไน (พ.ศ. ๒๕๕๐) ไต้หวัน (พ.ศ. ๒๕๕๑) สิงคโปร์ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็นต้น

ในเขตร้อนชื้น โรคเกิดแบบประปรายตลอดปี พบร้อยละในช่วงฤดูฝน ซึ่งอากาศเย็นและชื้น การระบาดมักเกิดขึ้นในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

๓. โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) กับ โรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) แตกต่างกันอย่างไร

โรคมือ เท้า ปาก นั้นเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน ส่วนโรคปากเท้าเปื่อย เกิด จำกไวรัสตัวอื่น เป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กีบ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น ทำให้สัตว์ป่วยมี อาการเป็นแผลที่ปากและกีบเท้า สัตว์ที่ป่วยมักไม่พยายามกัดหรือมีอัตราป่วยตายต่ำ ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อสัตว์คน โดยในอดีตเคยพบปูร์ป่วยเพียงไม่กี่ราย มีอาการเล็กน้อยและหายได้เองโดยไม่ต้องทำการรักษา

๔. สาเหตุของโรคมือ เท้า ปากเกิดจากอะไร

สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนแทโนไวรัลสายชนิด ที่พบบ่อย คือ เชื้อคอคอกแซกเก่ อี ๑๖ (coxsackie A๑๖) และไวรัสอีน่า ที่เป็นสาเหตุ ได้แก่ คอคอกแซกเก่ อี type อีน่า, คอคอกแซกเก่ บี (coxsackie B), เอคโคไวรัส (echovirus) และเอนแทโนไวรัส ๗๙ (enterovirus ๗๙ หรือ EV ๗๙)

๕. โรคมือ เท้า ติดต่อได้อย่างไร

โรคมือ เท้า ปาก มักติดต่อโดยการได้รับเชื้อจากอุจจาระ ฟองนมของน้ำนม น้ำลาย หรือน้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปาก การติดต่อทางน้ำหรืออาหารมีโอกาสเกิดได้บ่อย การแพร่ติดต่อเกิดขึ้น ค่อนข้างง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย และแม้อาการรุุเลาลงแล้ว ก็ยังอาจพรับเชื้อได้บ้าง เนื่องจาก เชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นานถึง ๖-๘ สัปดาห์

๖. ผู้ใหญ่สามารถติดโรคเมือ เห้า ปาก จากเด็กได้หรือไม่

ผู้ใหญ่มักมีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้จากการได้รับเชื้อขณะเป็นเด็ก ซึ่งภูมิคุ้มกันท่านนี้จะจำเพาะกับชนิดของไวรัสที่เคยได้รับเชื้อ หากได้รับเชื้อชนิดใหม่ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันไม่สามารถขจัดอาการของโรคหรือมีอาการเล็กน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่เด็กหรือผู้อื่นได้

๗. หญิงตั้งครรภ์ที่สัมผัสรู้ป่วยโรคเมือ เห้า ปาก เสี่ยงติดโรคหรือไม่

ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อจะไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่หากมีอาการป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลแสดงว่าการติดเชื้อมีผลต่อการแท้งบุตร ความพิการของเด็ก หรือเด็กเสียชีวิต ในครรภ์ อย่างไรก็ตาม เด็กอาจได้รับเชื้อขณะคลอดหากมารดาป่วยในช่วงใกล้คลอด เด็กแรกเกิดที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรง

การป้องกันทำได้โดยการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี (อ่านรายละเอียดในหัวข้อ “จะป้องกันโรคได้อย่างไร”) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อรับเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์และระหว่างคลอด

๘. หากติดเชื้อแล้วจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่

ส่วนใหญ่แสดงอาการป่วยภายใน ๓ - ๕ วันหลังได้รับเชื้อ โดยใช้เป็นอาการแสดงเริ่มแรกของโรค

๙. อาการของโรคเป็นอย่างไร

เริ่มตัวไข้ (อาจเป็นไข้สูงในช่วง ๑ - ๒ วันแรก และลดลงเป็นไข้ต่ำๆ อีก ๒ - ๓ วัน) มีจุดหรือฝีนแดงอักเสบในปาก มักพบที่ลิ้น เหงือก และกระพุงแก้ม ทำให้เก็บปากไม่อยากทานอาหาร จะเกิดฝีนแดงซึ่งจะกลâyเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง ที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และขาพับที่ยืน เช่น ก้น หัวเข่า ฯลฯ ผื่นนี้จะกลâyเป็นตุ่มพองใสรอบๆ แดง (maculo-papular vesicles) มักไม่คัน แต่เวลากดจะเจ็บ ต่อมากจะแตกออกเป็นหลุมตื้นๆ (ulcer) อาการจะตื้นๆ และแผลหายไปใน ๗ - ๑๐ วัน

ในเด็กทารกและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี บางรายอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (aseptic meningitis) ก้านสมองอักเสบ (brain stem encephalitis) ตามมาด้วยปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตตื้นเหลว ทำให้เสียชีวิตได้ สัญญาณอันตรายได้แก่ ไข้สูงไม่ลดลง ชิม อาเจียนบ่อย หอบ และแขนขาอ่อนแรง เกิดภาวะอัมพาตคล้ายใบสีโภ

๑๐. โครงบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคเมือ เห้า ปาก ที่รุนแรง

โดยที่รับเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการของโรค ผู้ป่วยมักมีอาการป่วยเล็กน้อย หายได้เองภายใน ๗ - ๑๐ วัน และหายไปมีผู้เสียชีวิตเลย แต่เด็กอ่อนและเด็กเสียก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าเด็กได้

๑๑. วินิจฉัยโรคเมือ เห้า ปาก ได้อย่างไร

โดยที่นำไปแพทย์จะวินิจฉัยจากอายุ ประวัติ และอาการ โดยสังเกตถักษณะผื่นหรือตุ่มแผลต่างๆ ที่ปรากฏ รวมถึงวินิจฉัยแยกจากโรคที่มีอาการแผลในปากอื่น ๆ เช่น โรคติดเชื้อเริ่มในช่องปาก ฯลฯ สำหรับการส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมักไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เพราะต้องใช้เวลานาน ๒ - ๕ สัปดาห์ เพื่อแยกและยืนยันเชื้อสาเหตุ ซึ่งทำในรายที่มีอาการรุนแรง หรือยืนยันการระบาด เท่านั้น

๑๒. โรคนี้รักษาได้หรือไม่

รักษาได้ตามอาการ โดยทั่วไปใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาคลอเซ็ ยาแก้ปวดฯลฯ แต่เมื่อยาด้านนี้รักษาด้วยเฉพาะ โรคนี้หากผู้ป่วยรับประทานอาหารได้แต่พักผ่อนพอ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เองในช่วง ๗-๑๐ วัน แต่ผู้ดูแลเด็กควรดูแลเด็กป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กแรก เด็กเล็ก และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อลดเกตอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงถึงเสียชีวิต และส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที

๑๓. จะป้องกันโรคมือ เห้า ปากได้อย่างไร

โรคนี้ยังไม่วัดชีวนิปปองกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมืออย่างน้ำและสบู่ เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนการรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็ก รวมถึงการไม่กอดลูกศิริใกล้ชิด ใช้ภาชนะอาหาร หรือของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ร่วมกับการรักษาความสะอาดหัวใจไป การจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ห้องน้ำ ห้องล้วน ห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะ

๑๔. หากบุตรหลานมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

แยกเด็กป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ ๕ - ๗ วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น แต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ชีบ อาเจียน ทอน เป็นต้น ต้องรีบพาเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

ไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สะพาน ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีระยะถ่ายเท่ากันได้ดี ใช้ผ้าปิดมูกปากเวลาอุจจาระ และระมัดระวังการไอจามรดกัน และผู้เดี่ยวๆ ถูเด็กสองสามมือให้สะอาดทุกครั้งหลังล้มผันน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

๑๕. หากมีเด็กป่วยจำนวนมากในโรงเรียน หรือสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ควรทำอย่างไร

มาตรการช่วงที่เกิดโรคระบาดต้องเน้นการสักดิ้นการแพะภัยกระจายของเชื้อ ซึ่งอาจมีความจำเป็นจะต้องประกาศเขตติดโรคและปิดสถานที่ เช่น สถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน โรงเรียนเด็กเล็ก (อาจรวมถึงร่วมน้ำ สถานที่แออัด ๆ) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันเด็กป่วย และเน้นการล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในโรงพยาบาลและบ้านเรือนที่มีผู้ป่วย ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้จัดการสถานที่รับเลี้ยงควรดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งการระบาดไปที่หน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปสอบสวนการระบาดให้ความรู้ และคำแนะนำ
- เผยแพร่คำแนะนำ เรื่องโรคมือ เห้า ปาก แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ช่วยป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัยของสภาพแวดล้อม และควรแยกของใช้ไม่ใช่ปัจจัยกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อนอาหาร ฯลฯ
- ผู้บริหารโรงเรียน ๗-๑๐ วัน หรือจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังเด็กคนอื่น ๆ
- ควรรีบพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- พิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดห้องโรงเรียนชั้นรา (กรณีมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายชั้นเรียน) ประมาณ ๕-๗ วัน

- หากพบว่ามีการระบาดของโรคเมือ เห้า ปาก หรือ มีผู้ป่วยติดเชื้อโ恩เทอโรไวรัส ๗๙ ในโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็ก พิจารณาให้ปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า ๒ ราย หากมีการป่วยกระจายในคลาบชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน พร้อมทำความสะอาด อุปกรณ์รับประทาน อาหาร, ของเล่นเด็ก, ห้องน้ำ, สรรว่ายน้ำ และให้มั่นใจว่าน้ำมีระดับคลอรีนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สรรว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้สารคลอไนยาฟอกขาว (๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน แล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด
- ทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ้งแผลให้แห้ง
- หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน ให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

๑๖. จะทำลายเชื้อได้อย่างไร

- เชื้อนี้ถูกทำลายโดยแสงอุตสาหกรรมในแสงแดด ในสภาพที่แห้ง เชื้อจะมีชีวิตอยู่ไม่นาน
- เชื้อนี้ถูกทำลายโดยการต้มที่ ๔๐-๖๐ องศาเซลเซียส นาน ๓๐ นาที
- เชื้อนี้ถูกทำลายได้ด้วยน้ำยาซักล้างทั่วไป, โซเดียมไฮPOCHLORITE (Sodium Hypochlorite) ๑% หรือ กูลูตราลดีไฮด์ (Glutaraldehyde), ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ๐.๓% และคลอรีน ผสมน้ำ ๐.๑ ppm (part per million) หากทำลายเชื้อในอุจจาระจะต้องใช้คลอรีนที่เข้มข้น มากกว่านี้
- เชื้อนี้ถูกทำลายได้โดยวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ (pasteurization), steam sterilization, Ethylene Oxide Sterilization (ETO) และ hydrogen peroxide gas plasma

๑๗. คลอรีนในสรรว่ายน้ำฆ่าเชื้อโรคเมือ เห้า ปาก ได้หรือไม่ เด็กมีโอกาสติดเชื้อโรคนี้จากสรรว่ายน้ำได้ไหม ความเข้มข้นของคลอรีนในสรรว่ายน้ำตามมาตรฐานต้องมีอย่างน้อย ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร (๑ ppm (part per million)) ซึ่งมีปริมาณคลอรีนเพียงพอที่จะทำลายเชื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรนำเด็กป่วยไปในสรรว่ายน้ำ และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสรรว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด

๑๘. ความเสี่ยงต่อผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศเกิดโรคระบาดมีมากน้อยเพียงใด

ไม่มีข้อห้ามการเดินทางระหว่างประเทศ เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ หากจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานว่ากำลังเกิดโรคระบาด ผู้ปกครองเด็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด รักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการขับถ่าย และไม่ควรพาเด็กไปสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สรรว่ายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และควรอยู่ในที่ที่มีระบบสาธารณสุขดี

๑๙. แจ้งการระบาด ได้ที่ใดบ้าง

- สำนักระบบวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. ๐-๒๕๕๐-๗๗๘๒, ๐-๒๕๕๐-๗๗๘๕
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๔๕-๘๗๐๖

๔๐. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ขอเอกสารและคำแนะนำได้ที่ใดบ้าง

๔.๑ กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตในพื้นที่
- กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๓๔๕-๘๗๐๖ แฟกซ์ ๐-๒๒๓๔๕-๑๙๓๖
- สำนักประชาดวิทยา โทร. ๐-๒๕๘๐-๑๘๘๒, ๐๒-๕๘๐๑๘๘๒
- สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐-๒๕๘๐ ๓๗๘๓, ๐-๒๕๘๐ ๓๗๘๕ แฟกซ์ ๐-๒๕๘๐ ๓๗๘๑

๔.๒ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

๔.๓ ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒
- เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th>
- เว็บไซต์สำนักโรคติดต่อทั่วไป <http://thaigcd.ddc.moph.go.th/>
- เว็บไซต์สำนักประชาดวิทยา กรมควบคุมโรค <http://epid.moph.go.th>
- เว็บไซต์ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย <http://www.thaipediatrics.org>
