ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๒๘

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค

เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๐
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐) พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม ๑๖,๗๙๐ ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๗ ราย ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ ๑๐ – ๑๔ ปี อัตราป่วยสูงสุด คือ ๘๐.๘๙ ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี (๕๔.๘๓) อายุ ๑๕ – ๒๔ ปี (๔๗.๐๔) อายุ ๐ - ๔ ปี (๓๐.๔๖) และอายุ ๒๕ - ๓๔ ปี (๒๕.๔๓) ตามลำดับ การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่า ภาคใต้ อัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ ๘๑.๔๗ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๗,๕๓๖ ราย มีผู้ป่วยตาย ๒๐ ราย รองลงมาได้แก่ภาคกลาง อัตราป่วย ๑๘.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ภาคเหนือ อัตราป่วย ๑๘.๖๐ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๒,๒๘๖ ราย มีผู้ป่วยตาย ๔ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย ๑๓.๑๒ ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วย ๒,๘๗๑ ราย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค ได้แก่ไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุณกุนยา) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อที่ใช้สำหรับการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ในการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์กำจัดยุงลายและไฟล์ซีดีเพลงโครงการรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ” ได้ที่ www.dla.go.th ในส่วนของ “หนังสือราชการ” หรือ http://www.thaivbd.org/n/contents/view/324885

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

มาตรการ

3 เก็บ 3 โรค

- เก็บบ้าน
- เก็บขยะ
- เก็บน้ำ

- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้

เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่เปิดฝาไม่ได้
ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ

เชิญชวนภาคประชารัฐ โหลด Application "พิชิตลูกน้ำยุงลาย"
ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทั้งระบบ Android (Play Store)
และ iOS (App Store) ติดตั้งฟรี ใช้งานง่าย ได้ประโยชน์
ในการช่วยป้องกันยุงลายกับตัวท่านและครอบครัว

ป้องกันตนเองและชุมชนอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจากยุงลาย

การป้องกันตนเอง

1. นอนกางมุ้งแม้แต่กลางวัน

2. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด

3. ใช้ยาทากันยุง
หรือยาจุดกันยุง

4. ใช้กลิ่นกันยุง เช่น
ตะไคร้หรือ
สารเคมีอื่นๆ

5. อยู่ในที่อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกและ
มีแสงสว่าง

6. กำจัดแหล่งน้ำขัง
ภายในที่พักอาศัย
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

7. ทำความสะอาด
ที่พักอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกันในชุมชน





รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ

- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน

ปิดบ้านให้มิดชิด

เพื่อไม่ให้ยุงลายเข้าพักอาศัย

เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้

เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้
ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ

ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

3เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

3โรค
- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.thaivbd.org

Geneva PTA3_01



ยุงลายกับโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 5 - 14 ปี

1. ไข้สูงลอย



- ✓ มีไข้สูง 39 - 40 องศาเซลเซียส ระยะ 2 - 5 วัน
- ✓ หน้าแดง
- ✓ มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ✓ ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ

2. อาการเลือดออก



- ✓ เลือดกำเดาไหล
- ✓ เลือดออกตามไรฟัน
- ✓ อาเจียนเป็นเลือด
- ✓ มีจุดเลือดออกตามตัว
- ✓ ถ่ายดำ

3. ตับโต



- ✓ ตับโตกดเจ็บ

4. ภาวะช็อก

เกิดจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด



- ✓ มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
- ✓ ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ซึม
- ✓ มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว
- ✓ มีอาการปวดท้องมาก
- ✓ อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
- ✓ ความดันต่ำ

รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวช่วยลดไข้ เป็นระยะๆ
2. ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล (ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน หรือไอบรุโปรเฟน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายกระเพาะอาหาร)
3. ดื่มน้ำผลไม้หรือน้ำเกลือแร่บ่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำ
4. หากผู้ป่วยมีอาการมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลดต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ปวดท้อง, ปัสสาวะน้อยลง, กระสับกระส่าย, มือเท้าเย็น, ชีพจรเบา - เร็ว, ความดันต่ำ
5. ภายใน 24 - 48 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีอาการไข้ลดลง แล้วเริ่มกินอะไรได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตราย





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

3เก็น เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ

3โรค โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.thaivbd.org

สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

Genesis PTA3_02

ยุงลาย กับ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ อาการไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่ ! อาการปวดข้ออาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหาย กลุ่มอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก



อาการของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

- มีไข้สูงอย่างฉับพลัน ประมาณ 40 องศาเซลเซียส



- มักเป็นร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกข้อ กระบอกตา หรือมีเลือดออกตามผิวหนัง



- อาจมีอาการคันร่วมด้วย

- อาการจะมีลักษณะคล้ายโรคไข้เลือดออก และหัดเยอรมัน แต่ไม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิต



- เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่จะมีอาการปวดที่รุนแรงกว่า

- อาการปวดอาจหายได้ภายใน 1-12 สัปดาห์



การรักษา

โรคไข้ปวดข้อยุงลายยังไม่มีวัคซีนสำหรับการรักษาจำเพาะ แต่จะใช้การรักษาตามอาการ เช่น อาการปวดข้อ อาการไข้ ดังนี้

1. กินยาแก้ปวด เพื่อลดไข้ (ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน หรือไอบรูโปรเฟน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติและระคายกระเพาะอาหาร)

2. ดื่มน้ำและนอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง

3. เช็ดตัวด้วยน้ำสะอาดเพื่อช่วยลดไข้

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

3เก็บ
- เก็บบ้าน
- เก็บขยะ
- เก็บน้ำ

3โรค
- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

สายด่วน 1422

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.thaivbd.org

ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น
วันไข้เลือดออกอาเซียน
DENGUE DAY
"ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก"
ไม่ให้ยุงเกิด
ไม่ให้ยุงกัด
ไม่ให้เสียชีวิต
www.ddc.moph.go.th 1422

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560)

	2560	*2559*	*2558*	*2557*	*2556*	*2555*
ป่วย (ราย)	16,790	20,395	30,457	12,918	66,299	20,660
ตาย (ราย)	27	17	17	12	62	18
อัตราป่วยต่อแสน	25.66	31.17	46.77	19.89	103.47	32.15
อัตราป่วยตาย(%)	0.16	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09

ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2560 มีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2559 ร้อยละ 17.67 (0.82 เท่า) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,530 ราย

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำแนกรายเดือน ปี 2560



ที่มา : ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

จัดทำโดย... กลุ่มเฝ้าระวังโรคและพฤติกรรมสุขภาพ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3104-5
โทรสาร. 0-2591-8433 www.thaivbd.org